


ATLAS de la BIODIVERSITE COMMUNALE



Saint-Vincent-sur-Jabron
(Alpes de Haute-Provence)

© Stéphane Lucas

ATLAS de la BIODIVERSITE COMMUNALE

de Saint-Vincent-sur-Jabron (Alpes de Haute-Provence)

Réalisation

Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur (CEN PACA)

Coordination et rédaction

Laura Granato (CEN PACA) et Lionel Quelin (CEN PACA)

Comité de relecture

Michel Watt
(commune de Saint-Vincent-sur-Jabron)
Mathilde Dusacq (CEN PACA)

Remerciements

La réalisation de cet Atlas de la Biodiversité Communale de Saint-Vincent-sur-Jabron a été rendue possible grâce à l'implication des partenaires et des particuliers ayant réalisé les observations.

Merci à tous les photographes qui ont accepté de voir leur cliché illustrer ce document.

Conception graphique

Audrey Hoppenot (CEN PACA)

Impression

Imprimerie de Haute Provence

SOMMAIRE



p.4

Géographie

p.5

Où en est-on de la connaissance de la biodiversité ?

p.9

Village et hameaux

p.12

Sur les murets

p.15

Dans les bassins et les mares

p.18

Dans les champs

p.23

Les cours d'eau et zones humides

p.28

Les forêts

p.33

Les falaises, balmes rocheuses et canyons

p.36

Les landes, garrigues et pelouses d'altitude

p.44

Liste des espèces faune et flore

GEOGRAPHIE



Vue sur l'entrée du village de Saint-Vincent-sur-Jabron

© L. Sapey-Triomphe

Au cœur de la vallée du Jabron, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron est délimitée au nord par la Montagne de Mare (1 622 mètres) et le Pied du Mulet, au sud par la Montagne de Lure (1 700 mètres au niveau de la Crête des Cavalets). Séparés par la rivière Jabron qui s'écoule d'ouest en est, se font face deux reliefs aux ambiances contrastées, de teinte méditerranéenne à l'adret de la Montagne de Mare et montagnarde à l'ubac de la Montagne de Lure.

La géologie est essentiellement marquée par les terrains calcaires, constitués par les falaises et les éboulis d'altitude, qui dominent les importants dépôts marneux de la vallée.

La vie de village s'est construite à partir de la fin du XIX^e siècle à La Ribièvre, le long de la route qui borde le Jabron. Auparavant, le village était perché sur la colline de la Motte et l'église reste le seul témoin encore debout de cette époque. En dehors du cœur du village, hameaux et fermes sont dispersés comme aux lieux-dits Aubard, Fréméson, Piedguichard, parfois au bout d'une longue piste caillouteuse comme à Clacouais ou à La Parandière.

- Population : environ 200 habitants
- Superficie de 30,2 km²
- Climat : de moyennes montagnes méditerranéennes
- Altitude : 585 à 1 723 m

OU EN EST-ON DE LA CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE ?

La collaboration entre le Conservatoire d'espaces naturels Provence Alpes Côte d'Azur (CEN PACA) et la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron débute en 2011 lorsque la commune, souhaitant mieux connaître, protéger et valoriser le patrimoine naturel de son territoire, sollicite l'antenne de Sisteron du CEN PACA. Association régionale agréée au titre de la protection de la nature, le CEN PACA accompagne alors la commune dans cette démarche (inventaires, accompagnement, sensibilisation du public).

Au fil des ans, diverses études et prospections de naturalistes passionnés contribuent à améliorer la connaissance de la biodiversité.

Le partage de cette connaissance est capital pour la commune qui invite chaque année les habitants à une soirée conférence-film autour d'un thème de la biodiversité : les grands mammifères de la Montagne de Lure, la flore des sommets, les rivières en tresse, les vieux arbres etc.

L'Atlas de la Biodiversité Communale mené en 2018 était l'occasion de compléter la connaissance là où elle manquait et de la compiler dans un ouvrage à destination de tous pour donner un aperçu du patrimoine naturel de Saint-Vincent-sur-Jabron.



Sortie nature sur la découverte des arbres remarquables de Saint-Vincent-sur-Jabron animée par le CEN PACA

© L. Sapey-Triomphé

FLORE


FLORE	Nombre d'observations			Nombre de taxons		
	HORS ABC	ABC	TOTAL	HORS ABC	ABC	TOTAL (sans doublons)
Plantes vasculaires	4 321	623	4 944	745	252	842
Mousses	22	0	22	19	0	19

FLORE	Augmentation des connaissances en % du nombre d'espèces	Niveau de connaissance du nombre d'espèces
Plantes vasculaires	13%	Bon
Mousses	0%	Insuffisant

FAUNE	Nombre d'observations			Nombre de taxons		
	HORS ABC	ABC	TOTAL	HORS ABC	ABC	TOTAL (sans doublons)
Papillons de jour (rhopalocères)	1850	345	2195	123	85	124
Papillons de nuit (hétérocères)	286	56	342	107	39	120
Orthoptères, Mantes et Phasmes	255	105	360	57	38	58
Coléoptères	170	27	197	79	20	84
Libellules	45	9	54	19	8	23
Autres arthropodes	89	90	179	37	51	68
Arachnides	9	1	10	7	1	8
Mollusques	47	162	209	26	42	49
Reptiles	182	32	214	7	4	8
Amphibiens	24	0	24	3		3
Oiseaux	1062	59	1121	105	35	107
Mammifères (hors chiroptères)	31	4	35	10	3	10
Chiroptères	31	0	31	18	0	18
Total (sans doublons)	4081	890	4971	598	326	680


FAUNE	Augmentation des connaissances en % du nombre d'espèces	Niveau de connaissance du nombre d'espèces
Papillons de jour (rhopalocères)	1%	Très bon
Papillons de nuit (hétérocères)	12%	Insuffisant
Orthoptères, Mantes et Phasmes	2%	Bon
Coléoptères	6%	Insuffisant
Libellules	21%	Bon
Autres arthropodes	84%	Insuffisant
Arachnides	14%	Insuffisant
Mollusques	88%	Moyen
Reptiles	14%	Bon
Amphibiens	0%	Moyen
Oiseaux	2%	Bon
Mammifères (hors chiroptères)	0%	Insuffisant
Chiroptères	0%	Moyen
Total (sans doublons)	14%	

NOMBRE D'ESPÈCES FLORE ET FAUNE CONNUES



*Ces données reflètent l'état des connaissances actuelles. Des espèces patrimoniales peuvent être présentes sur toute la commune.

LOCALISATION ET NOMBRE D'ESPÈCES DE FLORE ET FAUNE PATRIMONIALES



VILLAGE & HAMEAUX

Etant au cœur d'espaces de nature, les lieux urbanisés de Saint-Vincent-sur-Jabron peuvent côtoyer des espèces sauvages ou accueillir des espèces plus anthropophiles qui s'accommodeent voir même recherchent nos habitations comme lieux de vie.

Un jardin naturel entièrement dédié aux papillons, élaboré par l'association Proserpine a pris place en 2013 au cœur du vieux village. Des plantes hôtes des papillons (nourrissant les chenilles) sont plantées ainsi que des plantes nectarifères. Près de 70 espèces de papillons et de zygènes peuvent y être observées.

Pour faciliter l'observation des oiseaux du village et les aider à s'alimenter en hiver, la commune a installé des mangeoires autour de la mairie et de l'école.

La pollution lumineuse par les éclairages publics peut engendrer des perturbations sur la biodiversité nocturne. La commune s'est engagée depuis 2018 à éteindre les lampadaires en deuxième partie de nuit.



Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

© T. Lyon



Mésange bleue
(*Cyanistes caeruleus*)

© T. Lyon



Clairon des ruches
(*Trichodes alvearius*)

© S. Richaud- CEN PACA



Petit rhinolophe
(*Rhinolophus hipposideros*)

© M. Coulon- PN des Ecrins



Lézard des murailles
(*Podarcis muralis*)

© S. Van Oye- CEN PACA



Pentatome des baies
(*Dolycoris baccarum*)

© S. Richaud - CEN PACA



Hérisson
(*Erinaceus europaeus*)

© M. Marmier - CEN PACA



Grimpereau des jardins
(*Certhia brachydactyla*)

© T. Lyon



Pipistrelle commune
(*Pipistrellus pipistrellus*)

© M. Corail - PN Ecrins


SUR LES MURETS



Le long des chemins, routes, terrasses agricoles et enclos des propriétés de Saint-Vincent-sur-Jabron, les murets en pierres sèches (non maçonnés) font office de vraies jardinières sauvages et accueillent une flore spécialisée qui va mettre à profit le moindre espace pour pousser. Ils sont aussi des abris permanents pour la faune : insectes, amphibiens, petits mammifères, reptiles ou escargots.

Cétérach (*Asplenium ceterach*)

© Gilbert Billard - CBNA




Soucoupe commune
(*Helicigona lapicida*)

© D. Combrisson- PN des Ecrins



Capillaire des murailles
(*Asplenium trichomanes*)

© H. Vanderperte- CEN PACA



Orpin blanc
(*Sedum album*)

© H. Vanderperte- CEN PACA



Fumeterre officinale
(*Fumaria officinalis*)

© H. Vanderperte- CEN PACA



Pariétaire
(*Parietaria judaica*)

© Gilbert Billard- CBNA



Crapaud commun (*Bufo bufo*)
© T. Lyon



Rue des murailles
(*Asplenium ruta-muraria*)

© G. Billard- CBNA

DANS LES BASSINS & LES MARES

Toute petite retenue d'eau, artificielle ou naturelle, est bonne à prendre pour les amphibiens, les libellules et autres insectes aquatiques, qu'elle soit en plein cœur des villages, dans les lavoirs, ou dans les mares des lieux-dits de la Parandièvre, de Frémeson ou d'Aubard. On peut y observer au début du printemps, les têtards puis les adultes de l'Alyte accoucheur ou de la Salamandre tachetée, tandis qu'en plein été, c'est au tour des libellules et des demoiselles d'occuper les lieux. A la nuit tombée, les chauves-souris viennent y chasser les insectes et s'y abreuver.

Autour des mares, la végétation s'organise en ceinture avec une flore aquatique à hygrophile (qui aime l'eau).



Bassin

© L. Sapey-Triomphe



Alyte accoucheur (têtard)
(*Alytes obstetricans*)

© M. Corail - PN Ecrins



Alyte accoucheur (adulte)
(*Alytes obstetricans*)

© M. Corail - PN Ecrins



Potamot nageant
(*Potamogeton natans*)

Une belle station est présente à
l'étang des Jaillettes.

© H. Vanderperte - CEN PACA



Massette à larges feuilles
(*Typha latifolia*)

© JP. Dalmas - CBNA



Libellule à quatre tâches
(*Libellula quadrimaculata*)

© S. Richaud - CEN PACA



Petite nymphe au corps de feu
(*Pyrrhosoma nymphula*)

© S. Richaud - CEN PACA



Anax empereur (*Anax imperator*)

© S. Richaud - CEN PACA

DANS LES CHAMPS

Le terroir agricole occupe les meilleures terres du fond de vallée situées en bordure du Jabron et à proximité du village ainsi que sur les plateaux (Aubard). Il s'agit essentiellement de prairies de fauche et de cultures de céréales. L'arboriculture est apparue dans les années 80.



Prairie à Narcisses des poètes

© L. Sapey-Triomphe

On retrouve dans les champs de la commune plusieurs espèces de plantes dites « messicoles » (associées aux moissons). Ce sont des plantes considérées comme menacées qui bénéficient d'un Plan national d'actions. Leur régression est principalement due à l'intensification de l'agriculture et à l'abandon des terres peu productives.



Adonis flamme
(Adonis flammea)

Espèce annuelle
commensale des
cultures d'hiver sur
sols calcaire.

© H. Vanderpert - CEN PACA



Miroir de Vénus
(Legousia speculum-veneris)

Cette messicole est
appréciée des insectes
pollinisateurs.

© H. Vanderpert - CEN PACA



Glaïeul des
moissons
(Gladiolus italicus)

© H. Vanderpert - CEN PACA



Buplèvre à feuilles
ronde
(Bupleurum
rotundifolium)

© V. Bonnet - CBNA



Pie-grièche écorcheur
(*Lanius collurio*)

© T. Lyon



Tarier pâtre
(*Saxicola rubicola*)

© J. Jiguet - INPN



Clairon des abeilles
(*Trichodes apiarius*)

© S. Richaud - CEN PACA



Cicindèle champêtre
(*Cicindela campestris*)

© S. Richaud - CEN PACA



Mante religieuse
(*Mantis religiosa*)

© S. Richaud - CEN PACA

Sablé du Sainfoin
(*Polyommatus*
damon)

© S. Richaud - CEN PACA



Mélétee du
plantain
(*Melitaea cinxia*)

© S. Richaud - CEN PACA



L'Agreste
(*Hipparchia*
semele)

© S. Richaud - CEN PACA



Les arbres vieux, isolés, ou en alignement, présents en bordure de champs et près des fermes (saules, frênes, muriers, chênes etc.) ainsi que les arbres de vergers dits à « haute tige », constitués de variétés anciennes, sont particulièrement intéressants pour les oiseaux cavernicoles (hibou petit-duc, torcol fourmilier etc.) et les insectes saproxiliques (qui vivent du bois mort) comme le Pique-Prune.


Les saules étaient taillés en « têtards » (coupe des branches pour la vannerie), créant de nombreuses cavités et abris mis à profit par la faune. Les saules encore debout sont hélas vieillissants sans qu'ils n'y aient de jeunes arbres pour prendre la relève.



Arbres de plein champs dans les prairies de Saint-Vincent-sur-Jabron

© L. Sapey-Triomphe

LES COURS D'EAU & ZONES HUMIDES



Le Jabron prend sa source sur la commune des Omergues au Col de la Pigièrre et s'écoule en direction de l'est jusqu'à la Durance à Sisteron. Le Jabron est une rivière en tresse avec un débit fortement influencé par la pluviométrie. A sec sur certains tronçons en été, son débit augmente brutalement lors des gros épisodes orageux. Ses chenaux instables, qui se forment au gré des crues sont à l'origine d'une riche mosaïque d'habitats constitués de bancs de galets, de vasières, de roselières ou de fourrés de saules.

Le Jabron en hiver
© L. Sapey-Triomphe

Ces milieux originaux (roselières, vasières etc.) sont surtout visibles sur les communes de Noyers-sur-Jabron et Bevons où la rivière bénéficie encore d'un « espace de liberté » suffisant. A Saint-Vincent-sur-Jabron, l'endiguement de la rivière limite fortement la diversité de ces milieux. Les boisements riverains du Jabron (ripi-sylve) forment un cordon végétal qui protège les terres agricoles et les habitations des crues et sert de couloir de déplacements pour la petite et grande faune (chauves-souris, oiseaux etc.).

De nombreuses sources de versants, plus ou moins pérennes, alimentent les réseaux secondaires parfois denses comme le ravin de Vaubelle, le ravin de Verduègne, la Fontaine de l'Orme ou le torrent du Grand Vallat avant de rejoindre le Jabron.



Torrent du Grand Vallat

© L. Sapey Triomphe



Cinclus plongeur

(*Cinclus cinclus*)

© R. Chevalier PN des Ecrins



Le Morio
(*Nymphalis antiopa*)

© S. Richaud - CEN PACA



Couleuvre vipérine
(*Natrix maura*)

© J.-C. de Massary



Martin pêcheur d'Europe
(*Alcedo atthis*)

© J. Celse PACA



Bergeronette des ruisseaux
(*Motacilla cinerea*)

© M. Coulon - PN des Ecrins



Murin de Daubenton
(*Myotis daubentonii*)

© M. Corail - PN des Ecrins



La zone humide de Combe Belle

© M. Duscaq - CEN PACA

A Clacouais ou à Combe belle, les sources forment des zones humides. Ces milieux abritent une biodiversité spécifique liée à la présence d'eau en surface ou dans le sol. De par leur fonctionnement propre, les zones humides assurent différents services indispensables (stockage et restitution de l'eau, épuration, protection contre les crues etc.) au bon fonctionnement des bassins versants.



Damier de la Succise
(*Euphydryas aurinia aurinia*)

© S. Richaud - CEN PACA



Narcisse des poètes
(*Narcissus poeticus*)

© G. Billard - CBNA



Orchis des marais
(*Dactylorhiza* sp.)

© Lionel Quelin - CEN PACA



Ophioglosse commun
(*Ophioglossum*
vulgatum)

© M. Brunelliére - CEN PACA



Criquet des Roseaux
(*Mecostethus*
parapleurus)

© S. Richaud - CEN PACA



Salamandre tachetée
(*Salamandra salamandra*)

© G. Bernard - PN des Ecrins



Cordulegastre bidenté
(*Cordulegaster bidentata*)

© S. Richaud - CEN PACA


LES FORÊTS

Présents sur les versants bien ensoleillés de la Vallée du Jabron, les boisements de Chêne pubescent sont bien représentés.

L'ubac de la Montagne de Lure, beaucoup plus frais et humide, accueille quant à lui une belle hêtraie et dans sa partie la plus haute une hêtraie-sapinière. Ces formations sont particulièrement présentes aux Cavalets.

Des forêts de tilleuls et d'érables occupent de petites surfaces en pieds de falaises et sur les éboulis de gros blocs. Ce sont des petits boisements originaux, peu connus, grouillants d'abeilles au moment de la floraison des tilleuls.

Les pinèdes de Pin sylvestre ou de Pin noir (issus de plantations) occupent d'anciennes landes et pelouses abandonnées par le pastoralisme.



Hêtraie sapinière des Cavalets


© L. Sapey-Triomphe

Aux lieux-dits les Clos, la Casse, Pralonguet, La Régente, Pibrémond ou encore sur les versants de la Montagne de Saint-Michel, les forêts de chênes présentent une belle densité d'arbres vétérans (âgés ou très âgés), d'arbres à cavités ou morts qui abritent des insectes saproxiliques rares (qui se nourrissent ou vivent dans le bois morts). La présence de vieux arbres riches en cavités est héritée d'une ancienne pratique agro-pastorale, appelée la « ramée », qui consistait à ne couper que les branches afin de nourrir le bétail avec le feuillage. La transhumance n'était à l'époque pas une pratique courante.

Leur grand nombre fait de Saint-Vincent-sur-Jabron un territoire majeur pour la biodiversité liée aux gros arbres à cavités en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

LES MICRO-HABITATS DES ARBRES

L'arbre peut se composer d'une kyrielle de micro-habitats qui seront utilisés par la faune, la fonge et la flore pour toute ou partie de leur cycle de vie. Ces micro-habitats peuvent être de plusieurs natures : écorces décollées, loges de pics, fissures, cavités de pied, bois morts (debout ou au sol) etc. Ils seront provoqués par l'action d'animaux (les loges de pics), les aléas climatiques (foudre, gel), la coupe de branches ou bien le vieillissement progressif de l'arbre. La présence et l'abondance de micro-habitats dans une forêt est généralement en lien avec la maturité des arbres.



Vieux chêne à cavités

© L. Sapey-Triomphé



LA PIQUE-PRUNE (*Osmoderma eremita*)

© M. Brunellière - CEN PACA

Cet insecte de l'ordre des coléoptères est la plus grande Cétoine de France. L'espèce vit dans les cavités des arbres très âgés riche en humus. Dans la Vallée du Jabron, le Pique-prune est essentiellement présent dans les vieux chênes pubescents. Liée aux continuum de vieux arbres, l'espèce est menacée et en régression en France comme en Europe en raison de la gestion inappropriée des massifs forestiers et des bocages depuis plus de 50 ans.



Buxbaumie verte (*Buxbaumia viridis*)

Mousse très rare

© H. Vanderpert - CEN PACA



Écureuil roux (*Sciurus vulgaris*)

© S. Lucas - CEN PACA



Pic noir
(Dryocopus martius)

© R. Chevalier - PN des Ecrins



Grand Capricorne
(Cerambyx cerdo)

© H. Buyon - INPN



Chouette hulotte
(Strix aluco)

© D. Fiat - PN des Ecrins



Cerf elaphe
(Cervus elaphus)

© S. Lucas - CEN PACA



Tétras lyre
(*Lyrurus tetrix*)
© J. Guillet



Barbastelle
d'Europe
(*Barbastella
barbastellus*)

© M. Coulon - PN des Ecrins



Rosalie des Alpes
(*Rosalia alpina*)

© S. Richaud - CEN PACA



Grand Nègre des bois
(*Minois dryas*)

© S. Richaud - CEN PACA

LES FALAISES, BALMES ROCHEUSES & CANYONS

Plusieurs types de milieux rocheux, essentiellement calcaires et marneux, sont présents sur la commune. Des éboulis plus ou moins grossiers occupent les versants abrupts et les pieds de falaises au lieu-dit de Sous les Roches et au canyon du Grand Vallat. Une flore spécifique s'y installe en mettant à profit les fissures et interstices de la roche pour pousser, chercher l'eau et résister aux forts écarts de températures. Plusieurs espèces sont aussi avides de verticalité et profitent des failles pour s'installer.



Falaise et balme rocheuse au lieu-dit « Sous les Roches »

© L. Sapey-Triomphe



Scandix en étoile (*Scandix stellata*)


© L. Garraud - CBNA

Le Scandix en étoile est une des grandes raretés de la vallée car cette espèce des balme calcaires n'est présente en France que dans quelques localités des Hautes-Alpes et de la Vallée du Jabron.

Alexanor (*Papilio alexanor*)

L'Alexanor est un papillon protégé en France dont l'unique plante hôte, le Ptychotis saxifrage, pousse dans les éboulis calcaires mais aussi les bancs de galets des rivières.

© S. Richaud - CEN PACA





Monticole de roche
(*Monticola saxatilis*)

© J-C. Tempier - CEN PACA



Crave à bec rouge
(*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

© CEN PACA



Grand éphedra
(*Ephedra major*)

© Léa Bizard - CBNA



Hibou Grand-Duc
(*Bubo bubo*)

© S. Lucas - CEN PACA

LES LANDES, GARRIGUES & PELOUSES D'ALTITUDE

A l'étage supra-méditerranéen, les garrigues et les landes occupent des grandes étendues essentiellement sur les adrets de la commune. Sur substrat marneux ou marno-calcaire, elles sont dominées par le Buis (*Buxus sempervirens*) et, le Genêt cendré (*Genista cinerea*) et évoluent lentement vers la chênaie en l'absence de pâturage.



Pelouses et garrigues à lavande sur la montagne Saint-Michel

© S. Bence - CEN PACA

Sur les crêtes des montagnes de Mare, de Lure ou de Saint-Michel, des pelouses de crêtes, d'allure steppique, prennent place sur des sols plus superficiels exposés au vent et à la neige. Elles côtoient localement des garrigues à lavande vraie et des dalles rocheuses calcaires. Si elles ne sont pas pâturées trop intensément, ces pelouses sont d'une grande diversité floristique et abritent de très nombreuses espèces d'insectes et d'oiseaux.



Pelouses et landes de la montagne de Mare

© MA. Marchand - CEN PACA

Aphyllanthe de
Montpellier
(*Aphyllanthes
monspeliensis*)

Sur les terrains marno-calcaire dominent les prairies à Aphyllante de Montpellier

© L. Granato - CEN PACA





Lézard ocellé
(*Timon lepidus*)

© S. Lucas - CEN PACA



Bruant ortolan
(*Emberiza hortulana*)

© JP. Siblet - INPN



Criquet des garrigues
(*Omocestus raymondi*)

© S. Richaud - CEN PACA



Carpocoris pudicus

©S. Richaud - CEN PACA

Moiré provençal
(*Erebia epistygne*)

© S. Richaud - CEN PACA



Magicienne
dentelée
(*Saga pedo*)

© S. Richaud - CEN PACA



Hespérie des
Cirsés
(*Pyrgus cirsii*)

© S. Richaud - CEN PACA





Fauvette passerinette
(*Sylvia cantillans*)

© S. Siblet - INPN



Zygène cendrée
(*Zygaena rhadamentus*)

© S. Richaud - CEN PACA

La quantité et la qualité des papillons de jours et d'orthoptères (criquet, sauterelles et grillons) connus sur la commune révèle une belle diversité d'habitats ouverts et semi-ouverts.



Criquet provençal (*Arcyptera kheili*)

© S. Richaud - CEN PACA

Sur les sommets de la Montagne de Lure, les pelouses maigres et rocallieuses sont parsemées de Genévrier couché. Ces milieux ont constitué de tout temps un parcours pour les troupeaux locaux et transhumants.



Crêtes de la Montagne de Lure

© L. Granato - CEN PACA

**Genévrier thurifère
(*Juniperus thurifera*)**

Quelques beaux spécimens sont présents à la Parandièvre et à la Frigounière.

© H. Vanderpert - CEN PACA





Apollon
(*Parnassius apollo*)
© S. Richaud - CEN PACA



Gagée des prés
(*Gagea pratensis*)
© JC. Villaret - CBNA



L'Aigle royal
(*Aquila chrysaetos*)
© R. Clerc - INPN



Traquet moteux
(*Oenanthe oenanthe*)
© J.Siblet - INPN



Panicaut épine blanche
(*Eryngium spinalba*)
© H. Granier

Vipère d'Orsini (*Vipera ursinii*)

© J. Renet - CEN PACA

Ce petit serpent de 30 à 40 cm de long est l'un des plus rares de France. Emblème de la Montagne de Lure, la Vipère d'Orsini est une espèce discrète qui occupe les pelouses calcaires des crêtes, se nourrissant quasi-exclusivement de criquets et de sauterelles. Son venin est peu毒ique et lui est principalement utile pour digérer ses proies. Les très rares cas d'envenimation connus se sont avérés sans gravités et sans séquelles. C'est une espèce menacée en Europe, d'où les nombreuses précautions et actions de conservation à son égard.



LISTE DES ESPECES FAUNE

Groupe	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Mollusques	<i>Abida secale</i> (Draparnaud, 1801) <i>Aegopinella pura</i> (Alder, 1830) <i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758) <i>Candidula gigaxii</i> (L Pfeiffer, 1847) <i>Candidula unifasciata</i> (Poiret, 1801) <i>Cecilioides acicula</i> (O.F Müller, 1774) <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Charpentieria itala punctata</i> (Michaud, 1831) <i>Chondrina avenacea</i> (Bruguière, 1792) <i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765) <i>Clausilia rugosa parvula</i> (A Féussac, 1807) <i>Cochlodina triloba</i> (O Boettger, 1878) <i>Cochlostoma patulum</i> (Draparnaud, 1801) <i>Cochlostoma septemplicata</i> (Razoumowsky, 1789) <i>Comu aspersum</i> (O.F Müller, 1774) <i>Deroceras reticulatum</i> (O.F Müller, 1774) <i>Discus rotundatus</i> (O.F Müller, 1774) <i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud, 1805) <i>Eucobresia nivalis</i> (Dumont & Mortillet, 1854) <i>Euconulus callopticus</i> (Bourguignat, 1890) <i>Galba truncula</i> (O.F Müller, 1774) <i>Granaria variabilis</i> (Draparnaud, 1801) <i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758) <i>Helicodonta obvoluta</i> (O.F Müller, 1774) <i>Helix lucorum</i> (Linnaeus, 1758) <i>Helix pomatia</i> (Linnaeus, 1758) <i>Lauria cylindracea</i> (da Costa, 1778) <i>Macrogaster attenuata</i> (Rossmässler, 1835) <i>Merdigera obscura</i> (O.F Müller, 1774) <i>Phenacolimax major</i> (A Féussac, 1807) <i>Pomatias elegans</i> (O.F Müller, 1774) <i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801) <i>Pupilla triplicata</i> (S Studer, 1820) <i>Solatopupa similis</i> (Bruguière, 1792) <i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792) <i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Truncatellina calcarata</i> (Scacchi, 1833) <i>Urticicola glabellus</i> (Draparnaud, 1801) <i>Vallonia costata</i> (O.F Müller, 1774) <i>Vallonia excentrica</i> (Sterki, 1893) <i>Vitrea subrimata</i> (Reinhardt, 1871) <i>Xerocrassa geyeri</i> (Soós, 1926) <i>Xeropicta derbentina</i> (Krynicki, 1836) <i>Zebrina detrita</i> (O.F Müller, 1774)	Mailot seigle Petite luisantine Balée commune Hélicette chagrinée Hélicette du thym Aiguilette commune Escargot des haies Perlée massue Mailot avoine Clausilia commune Clausilia lisso Fuseau de Lure Cochlostome méridional Cochlostome commun Escargot petit-gris Loche laiteuse Bouton commun Semilimace aplatie Semilimace des neiges Conule méridional Limnée épaulée Maillot variable Soucoupe commune Veloutée plane Escargot turc Escargot de Bourgogne Maillot commun Buline boueux Semilimace des plaines Élégante striée Escargot minuscule Maillot pygmée Maillot cendré Maillot barillet Veloutée commune Maillot denté Fausse-veloutée des vallées Vallonie costulée Vallonie des pelouses Cristalline méridionale Hélicette des steppes Hélicelle des Balkans Bulime zébré
Amphibiens	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768) <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Alyte accoucheur Crapaud commun Salamandre tachetée
Reptiles	<i>Coronella girondica</i> (Daudin, 1803) <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) <i>Lacerta bilineata</i> (Daudin, 1802) <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) <i>Vipera ursini</i> (Bonaparte, 1835)	Coronelle girondine Couleuvre verte et jaune Lézard à deux raies Couleuvre vipérine Lézard des murailles Vipère aspic Vipère d'Orsini
Oiseaux	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) <i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766) <i>Scolopax rusticola</i> (Linnaeus, 1758) <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Roitelet huppé Tarier pâtre Bécasse des bois Serin cini

MAMMIFÈRES

Oiseaux	<i>Sitta europaea</i> (Linnaeus, 1758)	Sittelle torchepot
	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque
	<i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte
	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire
	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins
	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerine
	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grise
	<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée
	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette pitchou
	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc
	<i>Turdus merula</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon
	<i>Turdus philomelos</i> (C. L. Brehm, 1831)	Merle noir
	<i>Turdus viscivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Grive musicienne
	<i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	Grive draine
		Huppe fasciée
Artiodactyles	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen
	<i>Cervus elaphus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf élaphe
	<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois
	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	Sanglier
Carnivores	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen
	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux
Chiroptères	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe
	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune
	<i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)	Vespère de Savi
	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers
	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton
	<i>Myotis myotis</i> / <i>blythii</i>	Grand murin / Petit murin
	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer
	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler
	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl
	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune
	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach, 1825)	Pipistrelle pygmée
	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux
	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris
	<i>Plecotus macrobullaris</i> (Kuzjakin, 1965)	Oreillard montagnard
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe
	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe
	<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni
Lagomorphe	<i>Lepus europaeus</i> (Pallas, 1778)	Lièvre d'Europe
	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne
Rongeur	<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Écureuil roux
Coléoptères	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)	Hanneton commun
	<i>Micrus campanulae</i> (Linnaeus, 1767)	-
	<i>Mylabris quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767)	Mylabre à quatre points
	<i>Mylabris variabilis</i> (Pallas, 1781)	Mylabre variable
	<i>Netocia morio</i> (Fabricius, 1781)	Cétoine noire
	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)	-
	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	Oedémère ochracée
	<i>Opisilia coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	Phytoécie bleuâtre
	<i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1793)	-
	<i>Osmodes eremita</i> (Scopoli, 1763)	Pique-prune
	<i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761)	Drap mortuaire
	<i>Parexochomus nigromaculatus</i> (Coeze, 1777)	-
	<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)	-
	<i>Poecilium rufipes</i> (Fabricius, 1777)	-
	<i>Potosia cuprea</i> (Fabricius, 1775)	Cétoine cuivrée
	<i>Pseudovadonia livida</i> (Fabricius, 1777)	Pseudovadonie livide
	<i>Ptinus lichenum</i> (Marsham, 1802)	-
	<i>Rhamnus mordax</i> (De Geer, 1775)	Rhagie mordante
	<i>Rhaphitropis oxyacanthae</i> (C. Brisout de Barneville, 1863)	-

INSECTES

Coléoptères	<i>Rosalia alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes
	<i>Rutpela maculata</i> (Poda, 1761)	Lecture tacheté
	<i>Stenomax foudriii</i> (Mulsant, 1854)	-
	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)	-
	<i>Stictoleptura cordigera</i> (Fuessly, 1775)	-
	<i>Stictoleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	Lepture fauve
	<i>Trichius gallicus</i> (Dejean, 1821)	Triche du rosier
	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)	Clairon des ruches
	<i>Trichodes apianus</i> (Linnaeus, 1758)	Clairon des abeilles
	<i>Trichodes leucopsideus</i> (Olivier, 1795)	Clairon à épaulettes
Hétérocères	<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)	-
	<i>Tropinota hirta</i> (Poda, 1761)	-
	<i>Vadonia unipunctata</i> (Fabricius, 1787)	Vadonie à un point
	<i>Valgus hemipterus</i> (Linnaeus, 1758)	Cétoine punaise
	<i>Vibidia duodecimguttata</i> (Poda, 1761)	-
	<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)	-
	<i>Xylotrechus arvicola</i> (Olivier, 1795)	-
	<i>Acontia trabealis</i> (Scopoli, 1763)	Arlequinette jaune
	<i>Acronicta megacephala</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle mégacéphale
	<i>Adela australis</i> (Heydenreich, 1851)	-
Lépidoptères	<i>Aglaope infasta</i> (Linnaeus, 1767)	Aglaopé des haies
	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Point d'Exclamation
	<i>Amata phegea</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Pissenlit
	<i>Arctia villica</i> (Linnaeus, 1758)	Ecailler fermière
	<i>Aristotelia decurtella</i> (Hübner, 1813)	-
	<i>Aspitates galvaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Aspilette jaunâtre
	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma
	<i>Calliteara pudibunda</i> (Linnaeus, 1758)	Pudibonde
	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1760)	Céladon
	<i>Camptogramma bilineata</i> (Linnaeus, 1758)	Brocaille d'or
	<i>Catocala promissa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Promise
	<i>Charanyca trigrammica</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle trilignée
	<i>Charissa obscurata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gnophos obscure
	<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)	Géomètre à barreaux
	<i>Chrysocrambus craterella</i> (Scopoli, 1763)	-
	<i>Cixi glauca</i> (Scopoli, 1763)	Petite Epine
	<i>Cleta filacea</i> (Herrich-Schäffer, 1847)	Phalène du Queyras
	<i>Cosmia trapezina</i> (Linnaeus, 1758)	Trapèze
	<i>Deilephila porcellus</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Sphinx de la Vigne
	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglanlée
Diptères	<i>Drymonia querina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Demi-Lune blanche
	<i>Dysauxes punctata</i> (Fabricius, 1781)	Ménagère
	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée
	<i>Episeta linogrisea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle gris-de-lin
	<i>Epirhoe galitata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélanthie du Caille-Lait
	<i>Eriogaster catax</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx Evérie
	<i>Eriogaster lanestris</i> (Linnaeus, 1758)	Laineuse du Cerisier
	<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)	Double jaune
	<i>Euclidia mi</i> (Clerck, 1759)	Mi
	<i>Euphyia frustata</i> (Treitschke, 1828)	Larentie fruste
Hyménoptères	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écailler chinée
	<i>Euranthis plummistaria</i> (Villers, 1789)	Fidonie plumeuse
	<i>Evergestis sophialis</i> (Fabricius, 1787)	-
	<i>Gnophos furvata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Phalène de la Vironne
	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (Haworth, 1809)	Fausse-Eupithécie
	<i>Hadena compta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle de l'Oeillet
	<i>Hadula pugnax</i> (Hübner, 1824)	Hadène de l'Anarhine
	<i>Harpinia milhauseri</i> (Fabricius, 1775)	Dragon
	<i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808)	Armigère
	<i>Heliothis viresplaca</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle de la Cardère
Névroptères	<i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx gazé
	<i>Hemaris tityus</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx-Bourdon
	<i>Heterogynis penella</i> (Hübner, 1819)	Zygénule des Genêts
	<i>Horisme vitalbata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Horisme rayé

Hétérocères

<i>Hyphoraia testudinaria</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Ecaille des steppes
<i>Idaea seriata</i> (Schrank, 1802)	Vieillie
<i>Idaea subsericeata</i> (Haworth, 1809)	Acidale blanchâtre
<i>Isturgia limbaria</i> (Fabricius, 1775)	Phalène bordée
<i>Lacanobia w-latinum</i> (Hufnagel, 1766)	Noctuelle du Genêt
<i>Lamprosticta culta</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle soignée
<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne
<i>Lasiocampa trifolii</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Bombyx du Trèfle
<i>Lithosia quadra</i> (Linnaeus, 1758)	Lithose quadrille
<i>Lymantria dispar</i> (Linnaeus, 1758)	Disparate
<i>Lythria purpuraria</i> (Linnaeus, 1758)	Ensanglanée des Renouées
<i>Macroglossum stellatarum</i> (Linnaeus, 1758)	Maro-Sphinx
<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx de la Ronce
<i>Malacosoma alpicolum</i> (Staudinger, 1870)	Livrée des alpages
<i>Malacosoma castrense</i> (Linnaeus, 1758)	Livrée des prés
<i>Mimas tiliae</i> (Linnaeus, 1758)	Sphinx du Tilleul
<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Conigère
<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Noctuelle lythargyrée
<i>Mythimna sicula</i> (Treitschke, 1835)	Leucanie sicilienne
<i>Nomophila noctuella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	-
<i>Notodontia tritophus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Dromadaire
<i>Omnia cyclopea</i> (Graslin, 1837)	Cléopâtre cyclope
<i>Oncocera semirubella</i> (Scopoli, 1763)	Citronnelle rouillée
<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	Etrille
<i>Perconia strigillaria</i> (Hübner, 1787)	Boarmie rhomboïdale, Boarmie commune
<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle couleur de bronze
<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Panthère
<i>Pseudopanthera macularia</i> (Linnaeus, 1758)	Hémithée du Genêt
<i>Pseudoterpnia pruinata</i> (Hufnagel, 1767)	-
<i>Pyrausta purpuralis</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène sacrée
<i>Rhodometra sacraea</i> (Linnaeus, 1767)	Phalène calabraise
<i>Rhodostrophia calabra</i> (Petagna, 1786)	Bande rouge
<i>Rhodostrophia vibicaria</i> (Clerck, 1759)	-
<i>Saturnia pavonia / pavonella</i>	Grand Paon de nuit
<i>Saturnia pyri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Acidalie décorée
<i>Scopula decorata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Acidalie hardie
<i>Scopula immorata</i> (Linnaeus, 1758)	Frange picotée
<i>Scopula marginipunctata</i> (Goeze, 1781)	Acidalie ornée
<i>Scopula ornata</i> (Scopoli, 1763)	Ortholite bipunctée
<i>Scotopteryx bipunctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ortholite rétrécie
<i>Scotopteryx coarctaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	-
<i>Scotopteryx Hübner, 1825</i>	Sphinx mauresque
<i>Sphinx maurorum</i> (Jordan, 1931)	Cul-doré
<i>Sphrageidus similis</i> (Fuessly, 1775)	Ecaille striée
<i>Spiris striata</i> (Linnaeus, 1758)	-
<i>Stemmatophora brunnealis</i> (Treitschke, 1829)	Noctuelle cythérée
<i>Thalpophila matura</i> (Hufnagel, 1766)	Processionnaire du Pin
<i>Thaumetopœa pityocampa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Noctuelle en deuil
<i>Tyta luctuosa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hameçon, Binaire
<i>Watsonalla binaria</i> (Hufnagel, 1767)	Ecaille chaste
<i>Watsonarctia deserta</i> (Bartel, 1902)	C-noir
<i>Xestia c-nigrum</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène de la Vésubie
<i>Zygaena briata</i> (Esper, 1800)	Zygène du Sainfoin
<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygène de la Coronille
<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène des garrigues
<i>Zygaena erythrus</i> (Hübner, 1806)	Zygène de la Petite coronille
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Filipendule
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	-
<i>Zygaena hilaris</i> (Ochsenheimer, 1808)	Zygène de la Badasse
<i>Zygaena lavandulae</i> (Esper, 1783)	Zygène des bois
<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène du Lotier
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	-
<i>Zygaena minos / purpuralis</i>	-
<i>Zygaena nevadensis gallica</i> (Oberthür, 1898)	-

Hétérocères	<i>Zygaena nevadensis</i> (Rambur, 1858)	Zygène des Gesses
	<i>Zygaena occitanica</i> (Villers, 1789)	Zygène de la Badasse
	<i>Zygaena osterodensis</i> (Reiss, 1921)	Zygène de la Jarosse
	<i>Zygaena rhadamantus</i> (Esper, 1789)	Zygène cendrée
	<i>Zygaena romeo</i> (Duponchel, 1835)	Zygène de la Gesse
	<i>Zygaena sarpedon</i> (Hübner, 1790)	Zygène du Panicaut
	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine
	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés
	<i>Zygaena viciae charon</i> (Hübner, 1796)	-
Neurop-tères	<i>Dendroleon pantherinus</i> (Fabricius, 1787)	Ascalaphe soufré
	<i>Libelloides coccajus</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
	<i>Libelloides lacteus</i> (Brullé, 1832)	Ascalaphe ambré
Odonates	<i>Libelloides longicornis</i> (Linnaeus, 1764)	
	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschna bleue
	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur
	<i>Boyeria irene</i> (Boyer de Fonscolombe, 1838)	Aeschna paisible
	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1780)	Caloptéryx éclatant
	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptéryx vierge
	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle
	<i>Cordulegaster bidentata</i> (Selys, 1843)	Cordulégastre bidenté
	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé
Orthoptères, Mantes et Phasmes	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant
	<i>Lestes virens virens</i> (Charpentier, 1825)	Leste verdoyant méridional
	<i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule déprimée
	<i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule à quatre taches
	<i>Onychogomphus forcipatus</i> (Linnaeus, 1758)	Compe à forceps
	<i>Onychogomphus uncinatus</i> (Charpentier, 1840)	Compe à crochets
	<i>Orthetrum brunneum</i> (Boyer de Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun
	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant
	<i>Platycnemis latipes</i> (Rambur, 1842)	Agrion blanchâtre
Orthoptères, Mantes et Phasmes	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Petite nymphe au corps de feu
	<i>Sympetrum fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun
	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe
	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	Sympétrum sanguin
	<i>Acrotylus fischeri</i> (Azam, 1901)	OEdipode framboisine
	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	OEdipode automnale
	<i>Aiolopus strepens strepens</i> (Latreille, 1804)	Aiolope automnale
	<i>Anonconotus ghilianii</i> (Camerano, 1878)	Anolade noirâtre
	<i>Antaxius pedestris</i> (Fabricius, 1787)	Antaxie marbrée
	<i>Arcyptera fusca</i> (Pallas, 1773)	Arcyptière bariolée
Orthoptères, Mantes et Phasmes	<i>Arcyptera kheili</i> (Azam, 1900)	Arcyptière provençale
	<i>Barbitistes fischeri</i> (Yersin, 1854)	Barbitiste languedocien
	<i>Bicolorana bicolor</i> (Philippi, 1830)	Decticelle bicoloré
	<i>Calliptamus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien
	<i>Calliptamus italicus italicus</i> (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien
	<i>Calliptamus siciliae</i> (Ramme, 1927)	Caloptène provençal
	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux
	<i>Chorthippus binotatus binotatus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des Ajoncs
	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot
	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine
Orthoptères, Mantes et Phasmes	<i>Chorthippus mollis</i> (Charpentier, 1825)	Criquet des jachères
	<i>Chorthippus vagans</i> (Eversmann, 1848)	Criquet des Pins
	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	Conocéphale bigarré
	<i>Decticus albifrons</i> (Fabricius, 1775)	Decitique à front blanc
	<i>Decticus verrucivorus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Decitique verrucivore
	<i>Ephippiger diurnus</i> (Dufour, 1841)	Ephippigère des vignes
	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barnevile, 1848)	Criquet des mouillères
	<i>Euchorthippus elegantulus</i> (Zeuner, 1940)	Criquet blatard
	<i>Eugryllodes pipiens</i> (Dufour, 1820)	Grillon de montagne
	<i>Eupholidoptera chabrieri</i> (Charpentier, 1825)	Decticelle splendide
Orthoptères, Mantes et Phasmes	<i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826)	Criquet des Genêvriers

Orthoptères, Mantes et Phasmes

Cryllus campestris Linnaeus, 1758	Grillon champêtre
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée
Leptynia hispanica (Boisduval, 1878)	
Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)	Criquet des Roseaux
Myrmecotettix maculatus maculatus (Thunberg, 1815)	Criquet tacheté
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)	Grillon des bois
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie
Oedaleus decorus (Germar, 1825)	Oedipode soufrée
Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)	OEdipode rouge
Omocestus haemorrhoidalis (Charpentier, 1825)	Criquet rouge-queue
Omocestus petraeus (Brisout de Barneville, 1856)	Criquet des friches
Omocestus raymondi (Yersin, 1863)	Criquet des garrigues
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)	Criquet panus
Phaneroptera nana (Fieber, 1853)	Phanéroptère méridional
Pijnackeria masettii (Scali, Milani & Passamonti, 2013)	Phasme de Masetti
Platycleis affinis (Fieber, 1853)	Decticelle cōtière
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre
Podisma amedeognathoae (Fontana & Pozzobon, 2007)	Miramelle du Ventoux
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)	OEdipode stridulante
Saga pedo (Pallas, 1771)	Magicienne dentelle
Sphingonotus caeruleans (Linnaeus, 1767)	Oedipode aigue-marine
Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur
Stenobothrus fischeri (Eversmann, 1848)	Sténobothre cigalin
Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène
Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840)	Sténobothre bourdonneur
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée
Tetrix depressa Brisout de Barneville, 1848	Tétrix déprimé
Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte

Rhopalocères

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)	Gazé
Arethusa arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercurie
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail
Boloria dia (Linnaeus, 1767)	Petite Violette
Boloria euphrasne (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Ronce
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Filpendule
Brintesia circe (Fabricius, 1775)	Silène
Cacyreus marshalli (Butler, 1898)	Brun du pélargonium
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)	Argus vert
Carcharodus alceae (Esper, 1780)	Hespérie de la Mauve
Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)	Hespérie de la Ballote
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)	Hespérie de l'Épiaire
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)	Hermite
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)	Céphale
Coenonympha doris (Esper, 1782)	Fadet des garrigues
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	Fadet commun
Colias alfacariensis (Ribbe, 1905)	Floré
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille
Cupido argiades (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle
Cupido minimus (Fuessly, 1775)	Argus frèle
Cupido osiris (Meigen, 1829)	Petit Argus
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)	Demi-Argus, Argus violet
Erebia epistygne (Hübner, 1819)	Moiré provençal
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)	Moiré blanc-fascié
Erebia meolans (Prunner, 1798)	Moiré des Fétuques
Erebia neoridas (Boisduval, 1828)	Moiré automnal

Rhopalocères

Erebia triarius (Prunner, 1798)	Moiré printanier
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie
Euchloe crameri (Butler, 1869)	Piérie des Biscuitelles
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise
Euphydryas aurinia provincialis (Boisduval, 1828)	-
Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré
Fabriciana niobe (Linnaeus, 1758)	Chiffre
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)	Azuré des Cytises
Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)	Azuré de la Badasse
Conepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence
Conepteryx ihamni (Linnaeus, 1758)	Citron
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)	Lucine
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)	Comma
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)	Sylvandre
Hipparchia genova (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)	Agreste
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)	Faune
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)	Misis
Iphiclidies podalirius (Linnaeus, 1758)	Flambé
Iphiclidies podalirius podalirius (Linnaeus, 1758)	-
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)	Némusien
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)	Mégère, Satyre
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)	Gorgone
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)	Piérie du Sainfoin,
Leptidea sinapis / reali / juvenica	Les Piérides de la moutarde
Limenitis reducta (Staudinger, 1901)	Sylvain azuré
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin
Lycaena alciphron gordius (Sulzer, 1776)	Cuivré flamboyant
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun
Lycaena tityrus (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-célesté
Lysandra corydon (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré
Lysandra hispana (Heinrich-Schäffer, 1852)	Bleu-nacré d'Espagne
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	Myrtil
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil
Melanargia russiae (Esper, 1783)	Échiquier de Russie
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)	Mélérite du Plantain
Melitaea deione (Ceyer, 1832)	Mélérite des Linaires
Melitaea diamina (Lang, 1789)	Mélérite noirâtre
Melitaea didyma (Esper, 1778)	Mélérite orangée
Melitaea nevadensis (Oberthür, 1904)	Mélérite de Fruhstorfer
Melitaea parthenoides (Keferstein, 1851)	Mélérite des Scabieuses
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélérite des Centaureées
Minois dryas (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)	Morio
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)	Sylvaine
Papilio alexanor (Esper, 1800)	Alexanor
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)	Machaon
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	Tircis
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)	Apollon, Parnassien apollon
Phengaris arion (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpalet
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	Piérie du Chou
Pieris mannii (Mayer, 1851)	Piérie de l'Ibérie
Pieris napi (Linnaeus, 1758)	Piérie du Navet
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)	Piérie de la Rave
Plebejus argus (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles
Plebejus idas (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)	Robert-le-diable
Polyommatus amandus (Schneider, 1792)	Azuré de la Jarosse
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sablé du Sainfoin
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de l'Orobe

Rhopalocères

Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré du Mélilot
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)	Azuré du Plantain
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)	Sablé provençal
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)	Azuré de Chapman
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)	Hespérie des Potentilles
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)	Hespérie du Carthame
Pyrgus cirsii (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirses
Pyrgus foulquieri (Oberthür, 1910)	Hespérie des Hélianthème
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards, 1897)	Hespérie de l'Aigremoine
Pyrgus onopordi (Rambur, 1839)	Hespérie de la Malope
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille
Pyronia titonus (Linnaeus, 1771)	Amaryllis
Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel
Satyrium ilicis (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse
Satyrium spinii (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des Nerpruns
Satyrus actaea (Esper, 1781)	Petite Coronide
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)	Grande Coronide
Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chientid
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Belle-Dame
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)	Diane
Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)	Proserpine

LISTE DES ESPECES FLORE

	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Bryophytes	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor, 1818 <i>Bryum capillare</i> (Hedw., 1801) <i>Cephaloziella baumgartneri</i> (Schiffn., 1905) <i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt., 1869 <i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe, 1867 <i>Encalypta streptocarpa</i> (Hedw., 1801) <i>Encalypta vulgaris</i> (Hedw., 1801) <i>Eucladium verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp., 1846 <i>Euthynchiastrium pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen, 2002 <i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp., 1851 <i>Leptodon smithii</i> (Hedw.) E.Weber & D.Mohr, 1803 <i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr., 1816 <i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener, 1833 <i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968 <i>Radula complanata</i> (L.) Dumort., 1831 <i>Reboulia hemisphaerica</i> (L.) Raddi, 1818 <i>Trichostomum crispulum</i> (Bruch, 1829) <i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr., 1888 <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	
Plantes vasculaires	<i>Abies alba</i> Mill., 1768 <i>Acer campestre</i> L., 1753 <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 <i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalum</i> Mill., 1768 <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 <i>Achillea collina</i> (Becker ex Rchb.f.) Heimerl, 1883 <i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'if Érable champêtre, Acéraille Érable de Montpellier, Agas, Azerou Érable d'Italie Érable sycomore, Grand Érable Achillée des collines Achillée millefeuille

<i>Achillea odorata</i> L., 1759	Achillée odorante
<i>Achillea tomentosa</i> L., 1753	Achillée tomenteuse
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv., 1812	Calamagrostide argenteëe
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946	Calament acinos
<i>Aconitum anthora</i> L., 1753	Aconit anthora
<i>Aconitum lycocotonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman, 1878	Aconit de Naples
<i>Actaea spicata</i> L., 1753	Actée en épé
<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776	Adonis couleur de feu
<i>Aegilops ovata</i> L., 1753	Égilope ovale
<i>Aethionema saxatile</i> subsp. <i>saxatile</i> (L.) RBr., 1812	Aéthionéma des rochers
<i>Agromyza eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostis stolonifère
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773	Bugle petit-pin
<i>Alchemilla alpigena</i> Buser, 1894	Alchémille de Hoppe
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire
<i>Allium flavum</i> L., 1753	Ail jaune
<i>Allium narcissiflorum</i> Vill., 1779	Ail à fleur de Narcisse
<i>Allium rotundum</i> L., 1762	Ail arondi
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	Aulne blanchâtre
<i>Althaea hirsuta</i> L., 1753	Mauve hérisseé
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson à calice persistant
<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi, 1799	Alysson des champs
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier
<i>Amelanchier ovalis</i> subsp. <i>embergeri</i> Favarger & Steam, 1983	Amélanchier d'Emberger
<i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768	Mouron bleu
<i>Archusa italicica</i> Retz., 1779	Buglosse d'Italie
<i>Androsace chaixii</i> Gren., 1853	Androsace de Chaix
<i>Androsace villosa</i> L., 1753	Androsace velue
<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr., 1813	Androsace de Vital
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	Patte de chat
<i>Anthemis altissima</i> Spreng., 1826	Anthémis géante
<i>Anthemis triumfetti</i> (L.) DC., 1815	Camomille de Trionfetti
<i>Antericum liliago</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lys
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	Persil sauvage
<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl., 1864	Cerfeuil lustré
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Persil des bois
<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	Anthyllide des montagnes
<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	Anthyllide vulnéraire
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>foronae</i> (Sennen) Cullen, 1968	Anthyllide de Foronda
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>praecopera</i> (A.Kern.) Bornm., 1925	Anthyllide à fleurs rouges
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>vulneraria</i> L., 1753	Trefle des sables
<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>latifolium</i> (Mill.) Bonnier & Layens, 1894	Muflier
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L., 1753	Aphyllanthe de Montpellier
<i>Aquilegia reuteri</i> Boiss., 1854	Ancolie de Bertoloni
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Ancolie vulgaire
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalius
<i>Arabis alpina</i> L., 1753	Arabette des Alpes
<i>Arabis auriculata</i> Lam., 1783	Arabette dressée
<i>Arabis collina</i> subsp. <i>collina</i> Ten., 1815	Arabette des collines
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue
<i>Arabis nova</i> Vill., 1779	Arabette nouvelle
<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838	Arabette à fruits aplatis
<i>Arabis turrita</i> L., 1753	Arabette tourette
<i>Arenaria grandiflora</i> L., 1759	Sabline à grandes fleurs
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet
<i>Argyrolobium zanonii</i> (Tura) P.W.Ball, 1968	Argyrolobe de Linné
<i>Aristolochia pistolochia</i> L., 1763	Pistoloche
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie faux-plantain
<i>Arrenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Ray-grass français
<i>Artemisia absinthium</i> L., 1753	Armoise absinthe
<i>Artemisia alba</i> Tura, 1764	Armoise blanche
<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre
<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Asperge sauvage
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam., 1783	Asperge à feuilles ténues

Plantes vasculaires

<i>Asperugo procumbens</i> L, 1753	Râpette
<i>Asperula cynanchica</i> subsp. <i>cynanchica</i> L, 1753	Aspérule des sables
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L, 1753	Copillaire noir
<i>Asplenium ceterach</i> L, 1753	Cétérach
<i>Asplenium fontanum</i> (L) Bernh, 1799	Doradille de Haller
<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC, 1815	Doradille de Pétrarque
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L, 1753	Capillaire des murailles
<i>Asplenium trichomanes</i> L, 1753	Astragale nain
<i>Astragalus depressus</i> L, 1756	Astragale pourpre
<i>Astragalus hypoglossis</i> L, 1771	Espartette bâtarde
<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i> L, 1753	Astragale vésiculeux
<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>vesicarius</i> L, 1753	Athamanthe de Crète
<i>Athamanta cretensis</i> L, 1753	Avoine Brome
<i>Avenula bromoides</i> (Cowan) H.Scholz, 1974	Avoine pubescente
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort, 1868	Pâquerette
<i>Bellis perennis</i> L, 1753	Bouleau blanc
<i>Betula alba</i> L, 1753	Bouleau verrueux
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bifora rayonnante
<i>Bifora radians</i> M.Bieb, 1819	Lunettière à tiges courtes
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jord, 1864	Lunettière à feuilles de chicorée
<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel, 1810	Trefle bitumeux
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L) Ch.Stirt, 1981	Chlorette
<i>Blackstonia perfoliata</i> subsp. <i>perfoliata</i> (L) Huds, 1762	Gnaphale dressé
<i>Bombycilaena erecta</i> (L) Smoljan, 1955	Barbon pied-de-poule
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L) Keng, 1936	Brachypode de Phénicie
<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L) Roem. & Schult, 1817	Brachypode rameux
<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv, 1812	Brachypode des rochers
<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult, 1817	Brachypode des bois
<i>Brachypodium sylvaticum</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv, 1812	Brise intermédiaire
<i>Briza media</i> L, 1753	Brome érigé
<i>Bromus erectus</i> Huds, 1762	Brome mou
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> L, 1753	Brome du Japon
<i>Bromus japonicus</i> Thunb, 1784	Brome de Madrid
<i>Bromus madritensis</i> L, 1755	Brome raboteux
<i>Bromus squarrosum</i> L, 1753	Brome stérile
<i>Bromus sterilis</i> L, 1753	Brome des toits
<i>Bromus tectorum</i> L, 1753	Grémil des champs
<i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (L) IM.Johnst, 1954	Buplevre en faux
<i>Bupleurum falcatum</i> L, 1753	Buplèvre à feuilles rondes
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L, 1753	Buis commun
<i>Buxus sempervirens</i> L, 1753	Adenostyle à feuilles d'alliaire
<i>Cacalia alliariae</i> subsp. <i>alliariae</i>	Adénestyle glabre
<i>Cacalia alpina</i> L, 1753	Calament à grandes fleurs
<i>Calamintha grandiflora</i> (L) Moench, 1794	Calament glanduleux
<i>Calamintha nepeta</i> (L) Savi, 1798	Campanule des Alpes
<i>Campanula alpestris</i> All, 1773	Campanule agglomérée
<i>Campanula glomerata</i> L, 1753	Campanule farineuse
<i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>cervicarioides</i> (Schult.) Arcang, 1882	Campanule carillon
<i>Campanula medium</i> L, 1753	Campanule à feuilles de pêcher
<i>Campanula persicifolia</i> L, 1753	Campanule fausse-raiponce
<i>Campanula rapunculoides</i> L, 1753	Campanule raiponce
<i>Campanula rapunculus</i> L, 1753	Campanule à feuilles rondes
<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L, 1753	Campanule gantelée
<i>Campanula trachelium</i> L, 1753	Bourse à pasteur
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L) Medik, 1792	Dentaire pennée
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill) O.E.Schulz, 1903	Passerage drave
<i>Cardaria draba</i> (L) Desv, 1815	Cardoncelle des Montpelliérains
<i>Carduncellus monspeliensis</i> All, 1785	Chardon à feuilles de Carline
<i>Carduus carlinifolius</i> Lam, 1785	Chardon à pédoncules nus
<i>Carduus defloratus</i> L, 1759	Chardon noircissant
<i>Carduus nigrescens</i> subsp. <i>nigrescens</i> Vill, 1779	Chardon des Alpes
<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>alpicola</i> (Gillois) Chass. & Arénès, 1936	Laîche cuivrée
<i>Carex cuprina</i> (L.Sándor ex Heuff) Nendtv. ex AKern, 1863	Laîche à épis distants
<i>Carex distans</i> L, 1759	

<i>Carex divisa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck) W.Koch, 1923	Laîche de Leers
<i>Carex flacca</i> Schreb, 1771	Laîche glauque
<i>Carex halleriana</i> subsp. <i>halleriana</i> Asso, 1779	Laîche de Haller
<i>Carex hirta</i> L, 1753	Laîche hérissee
<i>Carex humilis</i> Leyss, 1758	Laîche humble
<i>Carex lippocarpos</i> Gaudin, 1804	Carex à fruits lustrés
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laîche de Paire
<i>Carex tenax</i> Reut, 1856	Laîche des Alpes méridionales
<i>Carex tomentosa</i> L, 1767	Laîche tomenteuse
<i>Carex viridula</i> subsp. <i>brachyrhyncha</i> (?elak) B.Schmid, 1983	Laîche éailleuse
<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All, 1773	Chardousse
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam) Schübl & G.Martens, 1834	Carline caulecente
<i>Carlina vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L, 1753	Carline commune
<i>Carthamus lanatus</i> L, 1753	Centaurée laineuse
<i>Castanea sativa</i> Mill, 1768	Châtaignier
<i>Catananche caerulea</i> L, 1753	Cupidone
<i>Catopodium rigidum</i> (L) C.E.Hubb, 1953	Pâturin rigide
<i>Caucalis platycarpas</i> L, 1753	Caucalide
<i>Cedrus atlantica</i> (Manetti ex Endl) Carrière, 1855	Céaire de l'Atlas
<i>Centaurea calcitrapa</i> L, 1753	Centaurée chausse-trappe
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> L, 1753	Centaurée jacée
<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>leucophaea</i> (Jord) Arcang, 1882	Centaurée pâle
<i>Centaurea pectinata</i> L, 1763	Centaurée pectinée
<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>scabiosa</i> L, 1753	Centaurée scabieuse
<i>Centaurea solstitialis</i> L, 1753	Centaurée du solstice
<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>ciliolata</i> (?elak) Dostál, 1931	Centaurée panachée
<i>Centranthus angustifolius</i> (Mill) DC, 1805	Centranthe à feuilles étroites
<i>Centranthus calcitrapae</i> (L) Dufr, 1811	Centranthe chausse-trappe
<i>Centranthus lecoqii</i> Jord, 1852	Centranthe de Lecoq
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurss
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles étroites
<i>Cephalanthera rubra</i> (L) Rich, 1817	Céphalanthère rouges
<i>Cephalaria leucantha</i> (L) Schrad ex Roem. & Schult, 1818	Céphalaire blanches
<i>Cerastium arvense</i> L, 1753	Céraiste des champs
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L) Ces, 1844	Céraiste suffrutescent
<i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>brachypetalum</i> Desp. ex Pers, 1805	Céraiste à pétales courts
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céraiste nain
<i>Chaenorhinum minus</i> subsp. <i>minus</i> (L) Lange, 1870	Petite linaire
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> L, 1753	Senoussé
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L, 1753	Chénopode du bon Henri
<i>Chenopodium murale</i> L, 1753	Chénopode des murs
<i>Chenopodium vulvaria</i> L, 1753	Chénopode fétides
<i>Chondrilla juncea</i> L, 1753	Chondrille à tige de jons
<i>Cichorium intybus</i> L, 1753	Chicorée amères
<i>Cirsium acaule</i> Scop, 1769	Cirse sans tige
<i>Cirsium arvense</i> (L) Scop, 1772	Cirse des champs
<i>Cirsium eriophorum</i> (L) Scop, 1772	Cirse laineux
<i>Cirsium ferox</i> (L) DC, 1805	Cirse féroce
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L) Hill, 1768	Cirse de Montpellier
<i>Cirsium tuberosum</i> (L) All, 1785	Cirse bulbeux
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> (Savi) Ten, 1838	Cirse lancéolé
<i>Clematis vitalba</i> L, 1753	Clématis des haies
<i>Clypeola jonthaspi</i> L, 1753	Clypéole jonthaspi
<i>Colchicum autumnale</i> L, 1753	Colchique d'automne
<i>Colchicum longifolium</i> Castagne, 1845	Colchique de Naples
<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	Dauphinelle Consoude
<i>Convallaria majalis</i> L, 1753	Muguet
<i>Convolvulus arvensis</i> L, 1753	Liseron des champs
<i>Convolvulus cantabrica</i> L, 1753	Liseron des monts Cantabriques
<i>Cornus mas</i> L, 1753	Corouiller mâle
<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i> L, 1753	Sanguine
<i>oronilla minima</i> L, 1756	Coronille naïne
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> L, 1756	Coronille mineure
<i>Coronilla scorpioides</i> (L) W.D.J.Koch, 1837	Coronille scorpion

<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier
<i>Cota tinctoria</i> subsp. <i>tinctoria</i> (L.) Gay ex Guss, 1844	Cota des teinturiers
<i>Cotinus coggygria</i> Scop., 1771	Arbre à perroque
<i>Cotoneaster delphinensis</i> Chatenier, 1923	Cotonéaster du Dauphiné
<i>Cotoneaster integrifolius</i> Medik., 1793	Cotonéaster vulgaire
<i>Cotoneaster pyrenaicus</i> Cand., 1875	Cotonéaster des pyrénées
<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl., 1822	Cotonéaster tomenteux
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style
<i>Crepis albida</i> Vill., 1779	Crépide blanche
<i>Crepis foetida</i> subsp. <i>rheoadifolia</i> (M.Bieb.) Celak, 1871	Crépide à feuilles de Pavot
<i>Crepis pulchra</i> L., 1753	Crépide élégante
<i>Crepis pygmaea</i> L., 1753	Crépide naine
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm., 1913	Crépide de Nîmes
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thunb.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit
<i>Crocus versicolor</i> Ker Gawl., 1808	<i>Crocus</i> changeant
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	Gaillet croisette
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774	Cuscute à petites fleurs
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéris fragile
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	Cytise à feuilles sessiles
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i> L., 1753	Pied-de-poule
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman, 1882	Dactyle d'Espagne
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis de Fuchs
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis couleur de chair
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	Dactylorhize de mai
<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole
<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Bois-joli
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	Daucus carotte
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. & Kit., 1802	Dauphinelle fendue
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817	Canche à feuilles de jonc
<i>Dianthus caryophyllus</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Wulfen) Rouy & Foucaud, 1896	Pipolet
<i>Dianthus scaber</i> Chaix, 1785	Oeillet à poils rudes
<i>Dianthus sylvestris</i> subsp. <i>godronianus</i> (Lord) Camisans, 1985	Oeillet des bois
<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	Roquette jaune
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp. <i>pentaphyllum</i> Scop., 1772	Dorycnie à cinq feuilles
<i>Draba aizoides</i> L., 1767	Drave Faux Aizoon
<i>Draba muralis</i> L., 1753	Drave des murailles
<i>Echinops ritro</i> L., 1753	Échinops
<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune
<i>Elytrigia intermedia</i> subsp. <i>intermedia</i> (Host) Nevski, 1933	Chiendent intermédiaire
<i>Ephedra major</i> Host, 1831	Éphèdre des monts Nébrodes
<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi
<i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i> Vill., 1779	Épilobe Romarin
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérisson
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prèle des champs
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prèle des marais
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prèle
<i>Erigeron acer</i> L., 1753	Vergerette acre
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Bec-de-cigogne
<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Cicutaire
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium Fausse-Mauve
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	Drave de printemps
<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Panicaut champêtre
<i>Eryngium spinalba</i> Vill., 1779	Panicaut blanc des Alpes
<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i> (Jord.) P.W.Ball, 1990	Vélar de Provence
<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC., 1805	Vélar jaune pâle
<i>Eupatorium cannabinum</i> subsp. <i>cannabinum</i> L., 1753	Chanvre d'eau
<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	Euphorbe petit-cyprès
<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	Euphorbe douce
<i>Euphorbia falcatifolia</i> L., 1753	Euphorbe en faux
<i>Euphorbia helioscopia</i> L., 1753	Euphorbe réveil matin

<i>Euphorbia taurinensis</i> All, 1785	Euphorbe de Turin
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Bonnet-d'évêque
<i>Fagus sylvatica</i> L, 1753	Hêtre
<i>Falllopia convolvulus</i> (L) ÅLöve, 1970	Renouée liseron
<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas</i> (Lag.) Arcang, 1894	Fétuque Fenasse
<i>Festuca cinerea</i> Vill, 1786	Fétuque cendrée
<i>Festuca laevigata</i> Gaudin, 1808	Fétuque lisse
<i>Festuca marginata</i> subsp. <i>marginata</i> (Hack) K Richt, 1890	Fétuque de Timbal-Lagrange
<i>Festuca rubra</i> L, 1753	Fétuque rouge
<i>Festuca violacea</i> Schleich. ex Gaudin, 1808	Fétuque violacée
<i>Ficus carica</i> L, 1753	Figuier commun
<i>Filago vulgaris</i> Lam, 1779	Immortelle d'Allemagne
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	Filipendule vulgaire
<i>Fourraea alpina</i> (L) Greuter & Burdet, 1984	Arabette pauciflore
<i>Fragaria vesca</i> L, 1753	Fraisier sauvage
<i>Fragaria viridis</i> Weston, 1771	Fraisier vert
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl, 1804	Frêne à feuilles étroites
<i>Fraxinus excelsior</i> L, 1753	Frêne commun
<i>Fritillaria involucrata</i> All, 1789	Fritillaire à involucre
<i>Fumana ericoides</i> subsp. <i>montana</i> (Pomel) Güemes & Muñoz Carm, 1990	Hélianthème de Spach
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr, 1847	Fumana à tiges retombantes
<i>Fumaria officinalis</i> L, 1753	Fumeterre officinale
<i>Fumaria parviflora</i> Lam, 1788	Fumeterre à petites fleurs
<i>Fumaria vaillantii</i> subsp. <i>vaillantii</i> Loisel, 1809	Fumeterre de Vaillant
<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort, 1827	Cagée des prés
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Schübl. & GMartens, 1834	Galéopsis à feuilles étroites
<i>Galium anisophyllum</i> Vill, 1779	Gaillet à feuilles inégales
<i>Galium aparine</i> L, 1753	Gaillet gratteron
<i>Galium aparine</i> subsp. <i>tenerum</i> (Schleich. ex Gaudin) Cout, 1939	Gaillet grêle
<i>Galium aristatum</i> L, 1762	Gaillet aristé
<i>Galium corrudifolium</i> Vill, 1779	Gaillet à feuilles d'Asperge
<i>Galium lucidum</i> All, 1773	Gaillet à feuilles luisantes
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	Gaillet dressé
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>mollugo</i> L, 1753	Gaillet commun
<i>Galium obliquum</i> Vill, 1785	Gaillet oblique
<i>Galium odoratum</i> (L) Scop, 1771	Aspérule odorante
<i>Galium pseudohelweticum</i> Ehrend, 1960	Gaillet pseudohélétique
<i>Galium timeroyi</i> Jord, 1846	Gaillet de Timéroy
<i>Galium tricomutum</i> Dandy, 1957	Gaillet à trois cornes
<i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L, 1753	Caille-lait jaune
<i>Genista cinerea</i> subsp. <i>cinernea</i> (Vill) DC, 1805	Genêt cendré
<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i> L, 1753	Petit Genêt d'Espagne
<i>Genista pilosa</i> L, 1753	Genêt poilu
<i>Centiana lutea</i> L, 1753	Gentiane jaune
<i>Centiana verna</i> L, 1753	Gentiane printanière
<i>Gentiana verna</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) HKunze, 1971	Gentiane du Dauphiné
<i>Ceranium columbinum</i> L, 1753	Céramium des colombes
<i>Ceranium dissectum</i> L, 1755	Géranium découpé
<i>Ceranium lucidum</i> L, 1753	Géranium luisant
<i>Ceranium molle</i> L, 1753	Géranium à feuilles molles
<i>Ceranium purpureum</i> Vill, 1786	Géranium pourpre
<i>Ceranium pusillum</i> L, 1759	Géranium fluet
<i>Ceranium pyrenaicum</i> Burnf, 1759	Géranium des Pyrénées
<i>Ceranium robertianum</i> L, 1753	Herbe à Robert
<i>Ceranium rotundifolium</i> L, 1753	Géranium à feuilles rondes
<i>Ceranium sanguineum</i> L, 1753	Géranium sanguin
<i>Geum urbanum</i> L, 1753	Benoite commune
<i>Gladiolus italicus</i> Mill, 1768	Glaieul d'Italie
<i>Globularia bisnagarica</i> L, 1753	Globulaire commune
<i>Globularia cordifolia</i> L, 1753	Globulaire à feuilles cordées
<i>Globularia repens</i> Lam, 1779	Globulaire rampante
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L) RBr, 1813	Orchis moucherón
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Polypode du calcaire

Plantes vasculaires

<i>Gypsophila repens</i> L, 1753	Gypsophile rampante
<i>Hedera helix</i> L, 1753	Lierre grimpant
<i>Helianthemum apenninum</i> (L) Mill, 1768	Hélianthème blanc
<i>Helianthemum hirtum</i> (L) Mill, 1768	Hélianthème hérissé
<i>Helianthemum italicum</i> (L) Pers., 1806	Hélianthème d'Italie
<i>Helianthemum nummularium</i> (L) Mill, 1768	Hélianthème jaune
<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>italicum</i> (L) Ces, 1844	Hélianthème d'Italie
<i>Helictochloa pratinensis</i> subsp. <i>pratinensis</i> (L) Romero Zarco, 2011	Avoine des prés
<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill) Pilg, 1938	Avoine toujours verte
<i>Helictotrichon setaceum</i> (Vill) Henrard, 1940	Avoine soyeuse
<i>Helleborus foetidus</i> L, 1753	Hellébore fétide
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb, 1771	Hépatique à trois lobes
<i>Herniaria hirsuta</i> L, 1753	<i>Herniaria hirsuta</i> L, 1753
<i>Herniaria incana</i> Lam, 1789	<i>Herniaria incana</i> Lam, 1789
<i>Hesperis laciniata</i> All, 1785	<i>Hesperis laciniata</i> All, 1785
<i>Hieracium murorum</i> L, 1753	<i>Hieracium murorum</i> L, 1753
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L) Spreng, 1826	Orchis bouc
<i>Hippocrepis comosa</i> L, 1753	<i>Hippocrepis</i> à toupet
<i>Hippocrepis emerus</i> (L) Lassen, 1989	Coronille faux-séné
<i>Hordeum murinum</i> L, 1753	Orge sauvage
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang, 1882	Orge des lièvres
<i>Horungia petraea</i> (L) Rchb, 1838	Homme des pierres
<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix, 1785	Millepertuis à feuilles d'Hysope
<i>Hypericum perforatum</i> L, 1753	Millepertuis perforé
<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i> L, 1753	Herbe de la Saint-Jean
<i>Inula montana</i> L, 1753	Inule des montagnes
<i>Iris lutescens</i> Lam, 1789	Iris jaunâtre
<i>Isatis tinctoria</i> L, 1753	Pastel des teinturiers
<i>Jasminum fruticans</i> L, 1753	Jasmin jaune
<i>Juncus articulatus</i> L, 1753	Jonc à fruits luisants
<i>Juncus effusus</i> L, 1753	Jonc épars
<i>Juncus inflexus</i> L, 1753	Jonc glauque
<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L, 1753	Genévrier commun
<i>Juniperus sibirica</i> Lodd ex Burgsd, 1787	Genévrier nain
<i>Juniperus thurifera</i> L, 1753	Genévrier thurifère
<i>Kandis perfoliata</i> (L) Kerguélen, 1993	Tabouret perfolié
<i>Katapsaxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf, 1840	Selin à feuilles de sila
<i>Knautia integrifolia</i> (L) Bertol, 1836	Knautie à feuilles entières
<i>Knautia timeroyii</i> subsp. <i>collina</i> (Schübl & G.Martens) Breistr, 1940	Knautie pourpre
<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i> (Honck) Caudin, 1808	Koelerie du Valais
<i>Labium alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835	Aubour des Alpes
<i>Lactuca perennis</i> L, 1753	Laitue vivace
<i>Lactuca serriola</i> L, 1756	Laitue scariole
<i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>chondrilliflora</i> (Bureau) Bonnier, 1923	Laitue
<i>Lamium amplexicaule</i> L, 1753	Lamier amplexicaule
<i>Lamium maculatum</i> (L) L, 1763	Lamier maculé
<i>Lamium purpureum</i> L, 1753	Lamier pourpre
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> L, 1753	Lampsane commune
<i>Laserpitium gallicum</i> L, 1753	Laser de Gaule
<i>Laserpitium siler</i> L, 1753	Laser siler
<i>Lathraea squamaria</i> L, 1753	Clandestine écaleuse
<i>Lathyrus aphaca</i> L, 1753	Gesse aphylle
<i>Lathyrus cicera</i> L, 1753	Gessette
<i>Lathyrus filiformis</i> (Lam.) J.Gay, 1857	Gesse de Bauhin
<i>Lathyrus latifolius</i> L, 1753	Gesse à larges feuilles
<i>Lathyrus pratensis</i> L, 1753	Gesse des prés
<i>Lathyrus setifolius</i> L, 1753	Gesse à feuilles fines
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz, 1783	Gesse à fruits ronds
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf, 1892	Gesse de Vénétie
<i>Lathyrus vernus</i> (L) Bernh, 1800	Gesse printanière
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> Mill, 1768	Lavande officinale
<i>Legousia hybrida</i> (L) Delarbre, 1800	Spéculaire miroir de Vénus
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L) Chaix, 1785	Miroir de Vénus

<i>Lens nigricans</i> (M.Bieb.) Codd, 1843	Lentille sauvage
<i>Leontodon crispus</i> Vill., 1779	Liondent crépu
<i>Leontodon hirtus</i> L., 1759	Liondent de Villars
<i>Lepidium campestre</i> (L.) RBr., 1812	Passerage champêtre
<i>Lepidium hirtum</i> subsp. <i>hirtum</i> (L.) Sm., 1818	Passerage hérissée
<i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Gremli, 1898	Leucanthème brûlé
<i>Leucanthemum ircutianum</i> DC., 1838	Marguerite
<i>Leucanthemum pallens</i> (J.Gay ex Perreyen) DC., 1838	Marguerite pâle
<i>Leuzea conifera</i> (L.) DC., 1805	Pomme-de-pin
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène
<i>Lilium martagon</i> L., 1753	Lis martagon
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif
<i>Linum narbonense</i> L., 1753	Lin de Narbonne
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1978	Lin à feuilles de Salsola
<i>Listera ovata</i> (L.) RBr., 1813	Grande Listière
<i>Lithospermum permixtum</i> Jord., 1855	Grémil
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace
<i>Lolium rigidum</i> subsp. <i>rigidum</i> Caudin, 1811	Ivraie à épis serré
<i>Lonicera alpigena</i> L., 1753	Chèvrefeuille alpin
<i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795	Chèvrefeuille de Toscane
<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> L., 1753	Sabot-de-la-mariée
<i>Lotus delortii</i> Timb.-Lagr. ex F.W.Schultz, 1852	Lotier de Delort
<i>Lotus maritimus</i> L., 1753	Lotier maritime
<i>Luzula nivea</i> (Nathh.) DC., 1805	Luzule blanche
<i>Luzula sieberi</i> Tausch, 1836	Luzule de Sieber
<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	Pommier sauvage
<i>Malva neglecta</i> Wall., 1824	Petite mauve
<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sauvage
<i>Mantisalca salmantica</i> (L.) Briq. & Cavill, 1930	Centaurée de Salamanque
<i>Marubium vulgare</i> L., 1753	Marlobe commun
<i>Medicago falcata</i> L., 1753	Luzerne sauvage
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline
<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne de Gérard
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée
<i>Melica amethystina</i> Pour., 1788	Mélique couleur d'améthyste
<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée
<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore
<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélilot blanc
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Mélilot jaune
<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds., 1762	Menthe à longues feuilles
<i>Mentha suaveolens</i> subsp. <i>suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes
<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale des montagnes
<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn., 1918	Sabline capillaire
<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb., 1842	Alsine changeante
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiem., 1899	Alsine calaminaire
<i>Moehringia muscosa</i> L., 1753	Moehringie mousse
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue
<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890	Molinie élevée
<i>Muscaris comosum</i> (L.) Mill., 1768	Muscari à toupet
<i>Muscaris neglectum</i> Guss. ex Ten., 1842	Muscari à grappes
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827	Pendrille
<i>Myosotis alpestris</i> F.W.Schmidt, 1794	Myosotis des Alpes
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	Myosotis des champs
<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux
<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	Narcisse des poètes
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	Néottie nid d'oiseau
<i>Nepeta nepetella</i> L., 1759	Népeta petit népeta
<i>Nigella damascena</i> L., 1753	Nigelle de Damas
<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv., 1811	Euphrase visqueuse
<i>Onobrychis supina</i> (Chaix ex Vill.) DC., 1805	Sainfoin couchée

Plantes vasculaires

<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>viciifolia</i> Scop., 1772	Sainfoin
<i>Ononis cristata</i> Mill., 1768	Bugrane à crête
<i>Ononis fruticosa</i> L., 1753	Bugrane buissonnante
<i>Ononis minutissima</i> L., 1753	Bugrane très grêle
<i>Ononis natrix</i> subsp. <i>natrix</i> L., 1753	Bugrane fétide
<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	Bugrane naine
<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse
<i>Onopordum acanthium</i> L., 1753	Onopordon faux-acanthe
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun
<i>Ophrys aranifera</i> subsp. <i>aranifera</i> Huds., 1778	Ophrys araignée
<i>Ophrys fuciflora</i> subsp. <i>fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802	Ophrys bourdon
<i>Ophrys insectifera</i> L., 1753	Ophrys mouche
<i>Ophrys virescens</i> Philippe, 1859	Ophrys verdissant
<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire
<i>Orchis pallens</i> L., 1771	Orchis casqué
<i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762	Orchis pâle
<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	Orchis pourpre
<i>Orthilia secunda</i> (L.) House, 1921	Orobanche grêle
<i>Osyris alba</i> L., 1753	Pirole unilatérale
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano, 1993	Rouvet blanc
<i>Papaver argemone</i> L., 1753	Pivoine officinale
<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Pavot argémone
<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	Pavot douteux
<i>Parietaria judaica</i> L., 1756	Coquelicot
<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Pariétaire des murs
<i>Pastinaca sativa</i> L., 1753	Parnassie des marais
<i>Pedicularis gyroflexa</i> Vill., 1785	Panaïs cultivé
<i>Petrohragia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Pédiculaire arquée
<i>Phagnalon sordidum</i> (L.) Rchb., 1831	Oeillet prolifère
<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomet, 1874	Phagnalon repoussant
<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>serotinum</i> (Jord.) Beirer, 1887	Orobanche rameuse
<i>Phlomis herba-venti</i> L., 1753	Fléole de Bertoloni
<i>Phyteuma orbiculare</i> L., 1753	Herbe au vent
<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	Raiponce orbiculaire
<i>Picromnia acama</i> (L.) Cass., 1826	Raiponce en épι
<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Crise acama
<i>Pilosella lactucella</i> subsp. <i>lactucella</i> (Wall.) P.D.Sell & C.West, 1967	Picride éperviaire, Épervière petite
<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Laitue
<i>Pimpinella sanguisorba</i> (L.) Gaertn., 1788	Piloselle
<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i> L., 1753	Pimprenelle à fruits réticulés
<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> J.F.Arnold, 1785	Persil de Bouc
<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin noir d'Autriche
<i>Pistacia terebinthus</i> L., 1753	Pin sylvestre
<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatius</i> (M.Bieb.) Asch. & Graebn., 1910	Pistachier térébinthe,
<i>Plantago argentea</i> Chaix, 1785	Pois cultivé
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain argenté
<i>Plantago major</i> L., 1753	Plantain lancéolé
<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcang., 1882	Plantain majeur
<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain serpentin
<i>Plantago semperflorens</i> Gratz, 1766	Plantain moyen
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Œil de chien
<i>Poa badensis</i> subsp. <i>molinerii</i> (Balb.) Duck-Henri & Favarger, 1987	Platanthère à deux feuilles,
<i>Poa bulbosa</i> L., 1753	Pâturin multiflore
<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>vivipara</i> (Koeler) Arcang., 1882	Pâturin bulbeux
<i>Poa centisia</i> All., 1789	Pâturin bulbeux vivipare
<i>Poa compressa</i> L., 1753	Pâturin du Mont Cenis
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin comprimé
<i>Poa nemoralis</i> var. <i>glauantha</i> (Caudin) Rchb., 1850	Pâturin des bois
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Pâturin des bois variété glauque
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun, 1841	Pâturin des près
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	Grand polyclème
<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	Polygale du calcaire

<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau de salomon odorant
<i>Polygonatum verticillatum</i> (L) All, 1785	Sceau de Salomon verticillé
<i>Polygonum aviculare</i> L, 1753	Renouée des oiseaux
<i>Polygonum bellardii</i> All, 1785	Renouée de Bellardi
<i>Polygonum persicaria</i> L, 1753	Renouée persicaire
<i>Polypodium cambricum</i> L, 1753	Polypode austral
<i>Polypodium vulgare</i> L, 1753	Réglisse des bois
<i>Polystichum lonchitis</i> (L) Roth, 1799	Polystic lonchyte
<i>Populus alba</i> L, 1753	Peuplier blanc
<i>Populus nigra</i> L, 1753	Peuplier noir
<i>Populus tremula</i> L, 1753	Peuplier tremble
<i>Potentilla cinerea</i> Chaix ex Vill, 1779	Potentille cendrée
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb, 1832	Potentille de Tabernaemontanus
<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Hornem, 1815	Potentille dressée
<i>Potentilla reptans</i> L, 1753	Potentille rampante
<i>Prenanthes purpurea</i> L, 1753	Prénanthe pourpre
<i>Primula veris</i> L, 1753	Coucou
<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (Ten) Maire & Petitit, 1908	Primevère de Colonna
<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds, 1762	Primevère acaule
<i>Prunella grandiflora</i> (L) Scholler, 1775	Brunelle à grandes fleurs
<i>Prunella hyssopifolia</i> L, 1753	Brunelle à feuilles d'hysope
<i>Prunella laciniata</i> (L) L, 1763	Brunelle laciniée
<i>Prunella vulgaris</i> L, 1753	Brunelle commune
<i>Prunus dulcis</i> (Mill) D.A.Webb, 1967	Amandier amer
<i>Prunus mahaleb</i> L, 1753	Bois de Sainte-Lucie
<i>Prunus spinosa</i> L, 1753	Prunellier
<i>Ptychotis saxifraga</i> (L) Loret & Barandon, 1876	Ptychotis à feuilles variées
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L) Bernh, 1800	Pulicaire dysentérique
<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (L) Delarbre, 1800	Anémone blanche
<i>Pylora chlorantha</i> Sw, 1810	Pyrole verdâtre
<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L) Ehrh, 1780	Poirier sauvage
<i>Pyrus spinosa</i> Forst, 1775	Poirier amandier
<i>Quercus pubescens</i> Willd, 1805	Chêne pubescents
<i>Ranunculus acris</i> L, 1753	Bouton d'or
<i>Ranunculus aduncus</i> Gren, 1847	Renoncule crochue
<i>Ranunculus arvensis</i> L, 1753	Renoncule des champs
<i>Ranunculus bulbosus</i> L, 1753	Renoncule bulbeuse
<i>Ranunculus gramineus</i> L, 1753	Renoncule graminée
<i>Ranunculus monspeliacus</i> L, 1753	Renoncule de Montpellier
<i>Ranunculus platanifolius</i> L, 1767	Renoncule à feuilles de platane
<i>Ranunculus repens</i> L, 1753	Renoncule rampante
<i>Ranunculus sartorianus</i> Boiss. & Heldr, 1854	Renoncule du Roussillon
<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>rugosum</i> (L) All, 1785	Ravanisle
<i>Reseda lutea</i> L, 1753	Réséda jaune
<i>Reseda luteola</i> L, 1753	Réséda jaunâtre
<i>Reseda phytœuma</i> L, 1753	Réséda rajponce
<i>Rhamnus alaternus</i> L, 1753	Nerprun alateme
<i>Rhamnus alpina</i> L, 1753	Nerprun des Alpes
<i>Rhamnus cathartica</i> L, 1753	Nerprun purgatif
<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq, 1762	Nerprun des rochers
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthie velu
<i>Rhinanthus minor</i> L, 1756	Petit crocriste
<i>Roegneria canina</i> (L) Nevski, 1934	Froment des haies
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies
<i>Rosa arvensis</i> Huds, 1762	Rosier des champs
<i>Rosa canina</i> L, 1753	Rosier des chiens
<i>Rosa pendulina</i> L, 1753	Rosier des Alpes
<i>Rosa rubiginosa</i> L, 1771	Rosier rubigineux
<i>Rosa spinosissima</i> L, 1753	Rosier à feuilles de Boucage
<i>Rosa vosagiaca</i> Desp, 1828	Rosier glauche
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i> L, 1753	Petite garance
<i>Rubus caesius</i> L, 1753	Rosier bleue
<i>Rubus canescens</i> DC, 1813	Ronce blanchâtre
<i>Rubus idaeus</i> L, 1753	Framboisier


<i>Rubus saxatilis</i> L, 1753	Ronce des rochers
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i> L, 1753	Rumex oseille
<i>Rumex crispus</i> L, 1753	Patience crépue
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i> L, 1753	Rumex joli
<i>Rumex scutatus</i> L, 1753	Oseille ronde
<i>Ruta angustifolia</i> Pers, 1805	Rue à feuilles étroites
<i>Salix alba</i> L, 1753	Saule blanc
<i>Salix eleagnos</i> Scop, 1772	Saule drapé
<i>Salix purpurea</i> L, 1753	Osier rouge
<i>Salvia aethiopis</i> L, 1753	Sauge d'Éthiopie
<i>Salvia pratensis</i> L, 1753	Sauge des prés
<i>Salvia sclarea</i> L, 1753	Sauge clairée
<i>Salvia verbenaca</i> subsp. <i>verbenaca</i> L, 1753	Sauge à feuille de verveine
<i>Sambucus ebulus</i> L, 1753	Sureau yéble
<i>Saponaria ocymoides</i> subsp. <i>ocymoides</i> L, 1753	Saponaire faux Basilic
<i>Saponaria officinalis</i> L, 1753	Saponaire officinale
<i>Satureja montana</i> L, 1753	Sarriette de montagne
<i>Saxifraga aizoides</i> L, 1753	Saxifrage cilié
<i>Saxifraga cuneifolia</i> subsp. <i>cuneifolia</i> L, 1759	Saxifrage à feuilles en coin
<i>Saxifraga exarata</i> Vill, 1779	Saxifrage sillonée
<i>Saxifraga granulata</i> L, 1753	Saxifrage granulé
<i>Saxifraga oppositifolia</i> L, 1753	Saxifrage à feuilles opposées
<i>Saxifraga paniculata</i> Mill, 1768	Saxifrage aizoon
<i>Saxifraga tridactylites</i> L, 1753	Saxifrage à trois doigts
<i>Scabiosa columbaria</i> L, 1753	Scabieuse colombaire
<i>Scabiosa lucida</i> Vill, 1779	Scabieuse luisante
<i>Scabiosa triandra</i> L, 1753	Scabieuse à trois étamines
<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Bonnier & Layens, 1894	Scandix d'Espagne
<i>Scandix stellata</i> Banks & Sol, 1794	Scandix étoilé
<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe-jonc
<i>Scorzonera laciniata</i> L, 1753	Scorzonère à feuilles de Chausse-trape
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>juratensis</i> (Schleicht. ex Wydler) Bonnier & Layens, 1894	Scrophulaire du Jura
<i>Scrophularia provincialis</i> Rouy, 1909	Scrophulaire de Provence
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989	Coronille changeante
<i>Sedum acre</i> L, 1753	Orpin acre
<i>Sedum album</i> L, 1753	Orpin blanc
<i>Sedum anopetalum</i> DC, 1808	Orpin à pétales droits
<i>Sedum atratum</i> L, 1763	Orpin noirâtre
<i>Sedum dasypodium</i> L, 1753	Orpin à feuilles serrées
<i>Sedum montanum</i> Perrier & Songeon, 1864	Orpin des montagnes
<i>Sedum rupestre</i> L, 1753	Orpin réflechi
<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau, 1909	Orpin blanc jaunâtre
<i>Sempervivum calcareum</i> Jord, 1849	Joubarbe des terrains calcaires
<i>Senecio doria</i> L, 1759	Séneçon Doria
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L, 1759	Séneçon doronic
<i>Senecio erucifolius</i> L, 1755	Séneçon à feuilles de Roquette
<i>Senecio provincialis</i> (L.) Druce, 1914	Séneçon de Gérard
<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> L, 1753	Séneçon commun
<i>Seseli galloprovinciale</i> Reduron, 1993	Séséli de Provence
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard, 1763	Seslerie blanchâtre
<i>Sherardia arvensis</i> L, 1753	Rubéole des champs
<i>Silene italica</i> (L.) Pers, 1805	Silène d'Italie
<i>Silene latifolia</i> Poir, 1789	Compagnon blanc
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>nutans</i> L, 1753	Silène penché
<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène cure-oreille
<i>Silene paradoxa</i> L, 1763	Silène
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène entié
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell, 1923	Silène couché
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Tapotte
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop, 1772	Herbe aux chantres
<i>Solanum dulcamara</i> L, 1753	Douce amère
<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron piquant
<i>Sonchus oleraceus</i> L, 1753	Laiteron potager

<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier blanc
<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs
<i>Sorbus domestica</i> L., 1753	Cormier
<i>Sorbus terminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier terminal
<i>Spartium junceum</i> L., 1753	Genêt d'Espagne
<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Épiaire annuelle
<i>Stachys recta</i> L., 1767	Épiaire droite
<i>Stachelia dubia</i> L., 1753	Stéheline douteuse
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux
<i>Stipa</i> offneri Breistr., 1950	Stipe d'Offner
<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés
<i>Sympodium tuberosum</i> L., 1753	Consoude à tubercles
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Tanaïse en corymbe
<i>Telephium imperati</i> L., 1753	Téléphium d'Impérato
<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde
<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne
<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes
<i>Teucrium polium</i> subsp. <i>polium</i> L., 1753	Germandrée Polium
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844	Pigamon des rochers
<i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. & W.D.J.Koch, 1826	Thésium divariqué
<i>Thymus longicaulis</i> C.Presl, 1826	Thym à tiges longues
<i>Thymus nervosus</i> J.Cay ex Willk., 1893	Thym à feuilles nervées
<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux pouliot
<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	Thym commun
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles
<i>Tolpis staticifolia</i> (All.) Sch.Bip., 1861	Épervière à feuilles de statice
<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle majeur
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilis des champs
<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb.f., 1867	Torilis à folioles étroites
<i>Torilis nodosa</i> subsp. <i>nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	Torilis noueuse
<i>Tragopogon crocifolius</i> L., 1759	Salsifis à feuilles de crocus
<i>Tragopogon dubius</i> Scop., 1772	Grand salsifis
<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>porrifolius</i> L., 1753	Salsifis du Midi
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) ?elak., 1871	Salsifis d'Orient
<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	Trèfle alpestre
<i>Trifolium avense</i> L., 1753	Trèfle des champs
<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre
<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes
<i>Trifolium ochroleucum</i> Huds., 1762	Trèfle jaunâtre
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant
<i>Trifolium thalii</i> Vill., 1779	Trèfle de Thal
<i>Trigonella monspeliaca</i> L., 1753	Luzerne de Montpellier
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	Trinie commune
<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817	Trisète distique
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Avoine dorée
<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) W.D.J.Koch, 1824	Trochiscanthe nodiflore
<i>Tulipa australis</i> Link, 1799	Tulipe des Alpes
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	Tordyle à larges feuilles
<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage
<i>Typha latifolia</i> L., 1753	Masquette à larges feuilles
<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Petit orme
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque
<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque
<i>Valeriana montana</i> L., 1753	Valériane des montagnes
<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale
<i>Valeriana tuberosa</i> L., 1753	Valériane tubéreuse
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805	Mâche couronnée
<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich, 1776	Mâche dentée
<i>Valerianella discoidea</i> (L.) Loisel., 1810	Mâche discoïde
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr., 1821	Mâche doucette
<i>Verbascum boerhaavei</i> L., 1767	Molène de Boerhaave
<i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779	Molène de Chaix
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnide

Plantes vasculaires

<i>Verbascum thapsus</i> L, 1753	Molène bouillon-blanc
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i> L, 1753	Herbe de Saint Fiacre
<i>Verbena officinalis</i> L, 1753	Verveine officinale
<i>Veronica arvensis</i> L, 1753	Véronique des champs
<i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L) DA Webb, 1972	Teuride d'Allemagne
<i>Veronica beccabunga</i> L, 1753	Véronique des ruisseaux
<i>Veronica chamaedrys</i> L, 1753	Véronique petit chêne
<i>Veronica officinalis</i> L, 1753	Véronique officinale
<i>Veronica peregrina</i> L, 1753	Véronique voyageuse
<i>Veronica persica</i> Poir, 1808	Véronique de Perse
<i>Veronica polita</i> Fr, 1819	Véronique luisante
<i>Veronica praecox</i> All, 1789	Véronique précoce
<i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>prostrata</i> L, 1762	Véronique prostrée
<i>Viburnum lantana</i> L, 1753	Viorne manciennes
<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>cracca</i> L, 1753	Vesce cracca
<i>Vicia dasycarpa</i> Ten, 1829	Vesce à gousses velues
<i>Vicia hirsuta</i> (L) Gray, 1821	Vesce hérisnée
<i>Vicia lutea</i> L, 1753	Vesce jaune
<i>Vicia onobrychoides</i> L, 1753	Vesce fausse esparselle
<i>Vicia pannonica</i> Crantz, 1769	Vesce de Hongrie
<i>Vicia pannonica</i> subsp. <i>striata</i> (M.Bieb.) Nyman, 1878	Vesce striée
<i>Vicia peregrina</i> L, 1753	Vesce voyageuse
<i>Vicia sativa</i> L, 1753	Vesce cultivée
<i>Vicia segetalis</i> Thun, 1799	Vesce des moissons
<i>Vicia sepium</i> L, 1753	Vesce des haies
<i>Vicia tenuifolia</i> subsp. <i>tenuifolia</i> Roth, 1788	Vesce à petites feuilles
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik, 1790	Dompte-venin
<i>Viola alba</i> Besser, 1809	Violette blanche
<i>Viola cenisia</i> L, 1763	Violette du mont Cenis
<i>Viola hirta</i> L, 1753	Violette hérisnée
<i>Viola odorata</i> L, 1753	Violette odorante
<i>Viola rupestris</i> Flv.Schmidt, 1791	Violette des sables
<i>Viola suavis</i> M.Bieb, 1819	Violette suave
<i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L, 1753	Gui des feuillus
<i>Vulpia unilateralis</i> (L) Stace, 1978	Vulpie unilatérale
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm, 1813	Xéranthème fétide
<i>Xeranthemum inapertum</i> (L) Mill, 1768	Immortelle à fleurs fermées





L'Atlas de la Biodiversité Communale mené en 2018 à Saint-Vincent-sur-Jabron était l'occasion d'aller compléter la connaissance naturaliste là où elle manquait et de la compiler dans un ouvrage à destination de tous pour donner un aperçu du patrimoine naturel de cette commune au cœur de la Vallée du Jabron (Alpes de Haute-Provence).

L'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche d'inventaire de la biodiversité à destination des collectivités.