

ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ
COMMUNALE
2019 - 2020

Collobrières
LE LIVRET DE L'ABC



ÉDITO

« Faire participer les Collobriérois à la découverte de leur patrimoine »



« Riche de près de 10 000 ha d'espaces forestiers, la commune de Collobrières bénéficie d'un territoire doté d'une biodiversité remarquable.

Depuis longtemps engagée dans une démarche de protection de la Nature, mise en valeur notamment, au moment du Festival de la Nature en mai de chaque année, la municipalité a toujours œuvré pour une éducation à la connaissance du grand public et notamment de celle des enfants.

L'adhésion à la démarche ABC, qui se situe dans la continuité de précédentes études, permet de connaître, de préserver et de valoriser un patrimoine naturel en regroupant toutes les connaissances sur la biodiversité et en mesurant l'évolution.

En apportant des informations fiables et précises en amont des décisions d'aménagement, l'identification des enjeux de la biodiversité éclairent les actions et stratégies territoriales.

Dans le cadre de cette démarche, des actions de sensibilisation et de mobilisation de la population, enjeux fondamentaux du projet, sont également conduites telles que des inventaires participatifs, des conférences et, à partir de l'année prochaine, des balades mensuelles gratuites menées par des guides naturalistes.

Consacré par l'obtention du Label 2 libellules, Territoire Engagé pour la Nature, dans le cadre de l'opération « Capitale Française de la Biodiversité » en 2018, Collobrières entend poursuivre son combat en diffusant et valorisant les bonnes pratiques pour la préservation de la biodiversité de son territoire. »

Christine AMRANE
Maire de Collobrières
Chevalier de l'Ordre national du Mérite

« Collobrières, en plein cœur du massif des Maures, joue un rôle important dans la préservation et la conservation de la biodiversité du Var »

« Le Syndicat mixte du Massif des Maures a accompagné la commune dans le montage et le dépôt du dossier auprès de l'Office français de la biodiversité, puis dans sa mise en œuvre sur le volet naturaliste. Un ABC est une bonne opportunité pour les sites Natura 2000 des Maures car il a pour objectif de préserver la nature en y impliquant les acteurs et les citoyens locaux. »

Magalie Aferiat - Animatrice Natura 2000 « Plaine et Massif des Maures »

« Faire participer les Collobriérois à la découverte de leur patrimoine »

« Entourés par 11 155 ha d'espaces naturels, soit 99 % du territoire, les Collobriérois vivent dans un véritable réservoir de biodiversité. La commune s'est lancée dans la démarche de l'ABC pour faire (re)découvrir cette richesse à laquelle on ne fait plus attention par habitude ou que l'on perçoit parfois comme une contrainte. Pour que nous prenions conscience de notre chance ! »



Nelly Laprée - Responsable environnement & urbanisme
Mairie de Collobrières

« Découvrir pour mieux respecter la Nature »




« Les Atlas de la biodiversité communale permettent la découverte d'une biodiversité souvent ignorée par les citoyens d'une commune. Grâce aux animations, participations et inventaires, chacun peut, aux côtés de structures comme le Conservatoire d'espaces naturels, en apprendre davantage et s'investir dans la préservation de l'environnement, en apprenant à l'admirer, pour le respecter. »

Vincent Mariani - Chargé de mission au CEN PACA
Coordinateur de l'ABC de Collobrières



Collobrières

Capitale des Maures



UN ABC, QU'EST-CE QUE C'EST ?

PAR QUI ?

La commune ! Une formidable initiative locale des mairies pour améliorer les connaissances naturalistes sur leur territoire. Un projet de développement durable, impliquant les citoyens dans la préservation de leur environnement. Financé par l'Office français de la biodiversité, sur candidature, la commune s'entoure ensuite d'autres structures expertes, comme le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour mener à bien le projet, les inventaires, les animations et la coordination.



© V. Mariani

Atlas

« Recueil ordonné de cartes, conçu pour représenter un espace donné et exposer un ou plusieurs thèmes. »

Biodiversité

« Ici, principalement sa composante "diversité spécifique", ensemble des espèces vivantes au sein d'un écosystème donné. »

Communale

« A l'échelle du territoire d'une commune, compris au sein de limites administratives établies. »

COMMENT ?

Sur Collobrières, la commune a sollicité le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'accompagner dans la démarche de l'ABC en 2019 et en 2020. L'association et la mairie ont alors travaillé ensemble, aux côtés du Syndicat mixte du Massif des Maures et de son animatrice Natura 2000, pour mettre en place les sessions d'inventaires, communiquer et impliquer les citoyens de la commune dans la démarche, informer la population via des réunions publiques, des conférences, des inventaires participatifs, etc.

POURQUOI ?

Rendre les citoyens acteurs de la préservation de la nature sur leur lieu de vie. L'amélioration des connaissances naturalistes contribue à une meilleure préservation de la biodiversité, aussi bien au niveau local qu'à une échelle plus étendue. Un ABC permet également de réunir l'ensemble des acteurs du territoire dans une démarche commune et enrichissante.

Collobrières, capitale des Maures



Massif des Maures

Ses paysages



Confaron



Pierrefeu-du-Var



Grimaud



Son agriculture



Son patrimoine



LES INVENTAIRES PARTICIPATIFS



Les inventaires participatifs permettent aux citoyens de la commune de découvrir, aux côtés d'experts naturalistes, les richesses naturelles de leur territoire. Grâce aux sorties, les participants apprennent à reconnaître les espèces et leur écologie, et participent à l'amélioration des connaissances naturalistes de leur commune.



Inventaire participatif « papillons », été 2020




Inventaire participatif « oiseaux », printemps 2019

Les Collobriérois ont pu ainsi participer, de 2019 à 2020, à plusieurs sessions thématiques sur la flore, les papillons de jours et les oiseaux. Reconnaissance des chants d'oiseaux, identification de plantes remarquables et de papillons de jour étaient au programme de ces sessions ludiques et pédagogiques !



Inventaire participatif « flore », printemps 2019





LES ANIMATIONS NATURE

La sensibilisation des plus jeunes constitue une des clés de l'avenir de la nature et de son respect. En apprenant à la comprendre, en découvrant ses richesses et ses fragilités, les futures générations seront d'autant plus impliquées dans la protection de la nature. L'Atlas de la biodiversité communale permet d'entreprendre ce type de démarches !



Sortie « découverte », printemps 2019

Les jeunes collobriérois, à l'école ou au centre aéré, ont pu bénéficier de sessions de découverte et de sensibilisation sur les oiseaux, la flore et les papillons. Des activités ludiques et pédagogiques, proposées par le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où sont abordées les notions de biodiversité, la fragilité de l'environnement ainsi que l'importance de la préservation du vivant pour les générations actuelles et futures.



Sortie « foiseaux », été 2020



Inventaire participatif « flore », printemps 2019



Atelier « jumelles », été 2020



LES RICHESSES FLORISTIQUES

Aristolochie pâle *Aristolochia pallida*

En France, elle est localisée seulement en Provence-Alpes-Côte d'Azur (sauf les Bouches-du-Rhône). Elle est rare en Basse-Provence. On la rencontre généralement dans les forêts de feuillus fraîches (chênaies pubescentes, châtaigneraies).



© J. Celse

Gagée des prés *Gagea pratensis*

En France, on la trouve en Alsace-Lorraine, dans le Val de Loire, le Massif central, les Pyrénées-Orientales, le sud-est. Elle est présente sur les pelouses plus ou moins sèches (rocailleuses ou non), dans des champs et surtout sur des sols calcaires. Elle est **protégée au niveau national**.



© J. Celse

Orchis de provence *Orchis provincialis*

L'Orchis de Provence est localisée sur l'aire méditerranéenne, de l'Espagne à la Turquie. Sur le territoire français, on la trouve dans un large quart sud-est et en Corse. Elle peut s'implanter entre 0 à 1 700 m d'altitude, de pleine lumière à mi-ombre, sur un substrat frais, souvent acide, plus rarement sur calcaire. Présente dans les garrigues, les forêts de feuillus et de conifères.



© J. Celse

Lis martagon *Lilium martagon*

Sur le territoire français, elle est commune en montagne (Vosges, Jura, Alpes, Massif central, Pyrénées). C'est une espèce à large amplitude, présente entre 1 000 à 2 400 m d'altitude plutôt sur des sols calcaires. Elle affectionne généralement les forêts de hêtres, de sapins, de mélèzes, les prairies alpines, ainsi que les zones humides. Le Lis martagon est **protégé au niveau départemental** (Alpes-Maritimes).



© H. Vandepiet



Narcisse des poètes
Narcissus poeticus

Présente de l'Europe centrale à l'Espagne. Assez commune aux étages montagnards et subalpins dans l'est et le sud-est de la France. Elle est absente ou bien rare en plaine. Elle s'implante dans les prairies humides et les marécages d'altitude (de 800 à 2 300 m). **Réglementée au niveau départemental** (Alpes-Maritimes).

Romulée de rolli
Romulea rollii

Cette espèce est localisée uniquement dans le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse. Très rare en Basse-Provence. On la rencontre généralement sur des terrains siliceux, et des dunes littorales.



Vesce noirâtre
Vicia melanops

On la retrouve au sud de l'Europe, de l'Espagne à la Turquie. En France, de nombreuses populations dans les Alpes-Maritimes, le centre Var, et les Maures sont présentes. Elle préfère les friches, les terrasses abandonnées, les broussailles, et peut se contenter des haies.




Sérapias en langue
Serapias lingua

Ce sérapias est un des plus répandus en France, il se rencontre de la Méditerranée au littoral atlantique. Il préfère les prés, landes et bois dans tous le midi, le sud-ouest et sud-est, jusque dans le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Charente inférieure et la Corse.




LES RICHESSES FLORISTIQUES



LES HABITATS REMARQUABLES



LES CHÂTAIGNERAIES



LES MARES ET RUISSEAUX TEMPORAIRES




LES RICHESSES FAUNISTIQUES

Oiseaux

Aigle royal

Aquila chrysaetos

L'Aigle royal est présent dans toute l'Europe du nord et dans les pays méditerranéens. On le trouve dans les régions montagneuses et dans les grandes forêts d'altitude, parfois dans de plus petits boisements en plaine. C'est une espèce menacée, classée « vulnérable » dans la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'Aigle royal est **protégé au niveau national et international**.



Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Le Circaète Jean-le-Blanc occupe les milieux arides et ouverts, les sols couverts de broussailles, les paysages de garrigues et de maquis. Il peut vivre aussi en moyenne montagne. Le Circaète, comme tous les rapaces, est **protégé en France**, selon la loi du 10 juillet 1976.

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

L'Engoulevent d'Europe fréquente surtout les pinèdes claires à sol sablonneux, clairières et jeunes parcelles ; également les boisements de feuillus et mixtes ; landes sèches arborées. Il est **protégé en France** : inscrit dans la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire (article 3), ainsi que sur la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Effraie des clochers


Tyto alba

L'Effraie des clochers est un rapace nocturne. Elle fréquente les milieux ouverts tels que les champs et prairies, bocages, landes ou marais, et les villages (combles d'églises, granges, greniers, tours). La Chouette effraie est classée « quasi-menacée » sur la Liste rouge régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur) de 2013. Elle est **protégée à plusieurs niveaux : national et européen**.





Oiseaux



Huppe fasciée

Upupa epops

La Huppe fasciée vit dans divers types de milieux ouverts et semi-ouverts, depuis la savane africaine jusqu'aux paysages bocagers des pays européens. Elle préfère les cultures et zones ouvertes, herbeuses, même pâturées avec bosquets, haies et buissons. La Huppe est **protégée en France**. Elle est classée en « préoccupation mineure » sur la Liste rouge régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Pie-grièche écorcheur est présente dans les étages montagnards et collinéens. Cette espèce privilégie les prairies de fauche et/ou de pâtures extensives toujours plus ou moins ponctuées de buissons bas (ronces), d'arbres isolés et d'arbustes divers (souvent épineux) et de clôtures (barbelés). Elle est inscrite dans la Directive Oiseaux de l'annexe I, puis au niveau national de l'article 3, ainsi que sur la Liste rouge régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, où l'espèce est classée en **préoccupation mineure**.



Rollier d'Europe

Coracias garrulus



Son habitat doit tenir compte de deux paramètres : des cavités essentielles à sa nidification, dans les forêts alluviales et les allées de platanes ou de peupliers. Ainsi, il apprécie la présence de zones dégagées, des espaces ouverts favorables à la chasse d'insectes (friches viticoles, campagnes cultivées, bois clairs). Le Rollier d'Europe est inscrit en « quasi-menacé » sur la Liste rouge régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Hibou Grand-duc d'Europe


Bubo bubo

Le Grand-duc est une espèce nocturne et partiellement crépusculaire. Il habite en zone de montagne et en forêt, à la recherche de rochers, de falaises, de vieux arbres (conifères). En hiver, il optera plutôt pour les terrains plats. Il est très sensible à la présence humaine. Il est inscrit en tant que « **préoccupation mineure** » sur la Liste rouge régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur) de 2013.



LES RICHESSES FAUNISTIQUES

OISEAUX





Papillons



Diane

Zerynthia polyxena

La Diane vit dans des habitats frais à humides tels que les fossés et les bordures de canaux agricoles ou de rivières, les prairies humides. Les chenilles sont observées sur l'Aristolochie à feuilles rondes et parfois sur l'Aristolochie clématite. Elle fait partie de la **liste des insectes strictement protégés de l'annexe 2** (Convention de Berne), et ainsi de la Directive Habitats de l'annexe IV, et de la Liste rouge des insectes de France.

Thécla de l'arbousier

Callophrys avis

Ce papillon fréquente de nombreux habitats tels que les maquis et les garrigues à arbousiers *Arbutus undedo*, dont les chenilles se nourrissent. La Thécla de l'arbousier n'a pas de protection réglementaire, mais elle est inscrite sur la Liste rouge régionale des papillons de jour de Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Morio

Nymphalis antiopa

Le Morio fréquente les bois riverains des cours d'eau ou des lacs et les lisières forestières fraîches. Les chenilles se développent sur les saules, parfois sur les peupliers ou sur les bouleaux. Il est classé « **vulnérable** » sur la Liste rouge régionale (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

LES RICHESSES FAUNISTIQUES

PAPILLONS





Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Hesperiidae	<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée	2019
	<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie du Marrube	1991
	<i>Carcharodus lavatherae</i> (Esper, 1783)	Hespérie de l'Épiaire	2019
	<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Tacheté austral	2020
	<i>Pyrgus sidae</i> (Esper, 1784)	Hespérie du Sida	2005
	<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des sanguisorbes	2020*
	<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du chiendent	1990
	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque	2019
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail	2020
	<i>Callophrys avis</i> Chapman, 1909	Thécla de l'Arbousier	2020
	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce	2005
	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	2020
	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides	2019
	<i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises	2019
	<i>Laeosopis roboris</i> (Esper, 1793)	Thécla du Frêne	2016
	<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	2019
	<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne	2020
	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun	2020
	<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	1982
Lycaenidae	<i>Lysandra hispana</i> (Herrich-Schäffer, 1852)	Bleu-nacré d'Espagne	2016
	<i>Lysandra hispana / coridon</i>	-	2020
	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	2016
	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane	2020
	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne	2020
	<i>Satyrus esculi</i> (Hübner, 1804)	Thécla du Kermès	1994
	<i>Satyrus ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse	2019
	<i>Scolitantides orion</i> (Pallas, 1771)	Azuré des Orpins	2005

*espèce surlignée en vert = première observation recensée dans le cadre de l'ABC



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Nymphalidae	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	2010
	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	2014
	<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Cardinal	2016
	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	2019
	<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette	1969
	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	2005
	<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Nacré de la Ronce	2019
	<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	2019
	<i>Charaxes jasius</i> (Linnaeus, 1767)	Nymphale de l'Arbousier	2020
	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	2020
	<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Moyen Nacré	2012
	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	1983
	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune	2020
	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	2019
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	2019
	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère	2020
	<i>Libythea celtis</i> (Laicharting, 1782)	Échancré	2010
	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré	2020
	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	2020
	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil	2019
	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain	2020
	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	2020
	<i>Melitaea nevadensis</i> Oberthür, 1904	Mélitée de Fruhstorfer	2020
	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mélitée des Centaurées	2011
	<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio	2020
	<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	2019



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	2020
	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma	2017
	<i>Pyronia bathseba</i> (Fabricius, 1793)	Ocellé rubané	2017
	<i>Pyronia cecilia</i> (Vallantin, 1894)	Ocellé de le Canche	2009
	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	2017
	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	2020
	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons	2020
Papilionidae	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé	2020
	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon	2020
	<i>Zerynthia polyxena</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Diane	2020
Pieridae	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	2020
	<i>Anthocharis euphenoides</i> Staudinger, 1869	Aurore de Provence	2018
	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé	2020
	<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré	2016
	<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	2020
	<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piérade des Biscutelles	2019
	<i>Gonepteryx cleopatra</i> (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence	2020
	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	2005
	<i>Leptidea sinapis</i> / <i>reali</i> / <i>juvernica</i>	Les Piérides de la moutarde	2020*
	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou	2019
	<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	Piérade de l'Ibérie	2016
	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet	2020
	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave	2020
	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	2019

*espèce surlignée en vert = première observation recensée dans le cadre de l'ABC



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	2017
	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	2019
	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	2020
	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	2020
	<i>Circus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	2020
	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	2007
	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	2010
	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Aigle botté	2007
	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	2020
	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	2010
Aegithinidae	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Orite à longue queue	2020
Alaudidae	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	2020
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	2017
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	2019
Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	2020
	<i>Apus pallidus</i> (Shelley, 1870)	Martinet pâle	2013
	<i>Tachymarptis melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	2019
Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	2017
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	2013
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	2020
Cettiidae	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	1985
Charadriidae	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Chevalier guignette	2017
	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	1989
Cinclidae	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cincla plongeur	2007
Columbidae	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset	2017
	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	2020
	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	2019
	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	2019



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Coraciidae	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Rollier d'Europe	2019
Corvidae	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau	2017
	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	2019
	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	2019
	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	2020
	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	2017
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	2020
Emberizidae	<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	2017
	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	2020
Falconidae	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	2007
	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	2017
	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	2014
	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crècerelle	2017
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	2007
	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	1994
	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	2007
	<i>Chloris chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	2020
	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	2010
	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	2020
	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	2020
Hirundinidae	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	2014
	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	2020
	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	2017
Laniidae	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	2014
Laridae	<i>Larus michaellis</i>	Goéland leucopée	1991
Meropidae	<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guépier d'Europe	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	2017
	<i>Motacilla alba alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	2017
	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	2017
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	1984
	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	2013
	<i>Phoenicurus ochrurus</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	2020
	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	2017
	<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâle	2017
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	2020
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	2020
	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	2020
	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	Mésange noire	1997
	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	2020
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	2017
Phasianidae	<i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	2007
	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	2019
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	2019
	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	2020
	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	2014
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	2020
	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	2020
	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	2017
	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	2020
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	2014
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	2020
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Strigidae	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	2007
	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athéna	2020*
	<i>Bubo bubo</i> , (Linnaeus 1758)	Grand-duc d'Europe	2020
	<i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou petit-duc, Petit-duc scops	2016
	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	2020
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet	2020
Sylvidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	2020
	<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	2020
	<i>Sylvia melanocephala</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette mélanocéphale	2020
	<i>Sylvia undata</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	2020
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	2017
Turdidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	2020
	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	2019
	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	2020
	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	2017
	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	2020
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	1979
Upupidae	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	2020

*espèce surlignée en vert = première observation recensée dans le cadre de l'ABC



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Adoxaceae	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Viorne tin	2020
Amaryllidaceae	<i>Allium roseum</i> L., 1753	Ail rose	2020
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	Cerfeuil des bois	2020
	<i>Chaerophyllum temulum</i> L., 1753	Chérophylle penché	2020
	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage	2020
	<i>Thapsia villosa</i> L., 1753	Thapsie	2020
Apocynaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	Dompte-venin	2020
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	2020
Aristolochiaceae	<i>Aristolochia pallida</i> Willd., 1805	Aristolochie pâle	2019
	<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel, 1874	Aristolochie à nervures peu nombreuses	2020
	<i>Aristolochia rotunda</i> L., 1753	Aristolochie à feuilles rondes	2020
Asparagaceae	<i>Asparagus acutifolius</i> L., 1753	Asperge sauvage	2020
	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906	Sceau de salomon odorant	2019
	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Petit houx	2020
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L., 1753	Anthémis des champs	2020
	<i>Carduus litigiosus</i> Nocca & Balb., 1821	Chardon litigieux	2020
	<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>polycephala</i> (Jord.) Nyman, 1879	Centaurée en panicule à nombreux capitules	2020
	<i>Crepis setosa</i> Haller f., 1797	Crépide hérissée	2020
	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter, 1973	Inule visqueuse	2020
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre	2020
	<i>Filago lutescens</i> Jord., 1846	Cotonnière jaunâtre	2020
	<i>Galactites tomentosus</i> Moench, 1794	Chardon laiteux	2020
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Immortelle des dunes	2020
	<i>Hieracium jaubertianum</i> Timb.-Lagr. & Loret, 1858	Epervière	2020
	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Epervière des murs	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Asteraceae	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre	2020
	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	2020
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	2020
	<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass., 1819	Phagnalon des rochers	2020
	<i>Pulicaria odora</i> (L.) Rchb., 1831	Pulicaire odorante	2020
	<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	Séneçon visqueux	2020
	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laiteron des champs	2020
	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertn., 1791	Trépane barbue	2020
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	2020
	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier	2020
Boraginaceae	<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	Lycopside des champs	2020
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de thalius	2020
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869	Bourse-à-pasteur rougeâtre	2020
	<i>Sisymbrium polyceratium</i> L., 1753	Sisymbre à nombreuses cornes	2020
Campanulaceae	<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce	2020
Cannabaceae	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufr., 1811	Centranthe chausse-trappe	2020
Caryophyllaceae	<i>Herniaria cinerea</i> DC., 1815	Herniaire cendrée	2020
	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	Herniaire velue	2020
	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Oeil-de-perdrix	2020
	<i>Moehringia pentandra</i> J.Gay, 1832	Moehringie à cinq étamines	2020
	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée	2020
	<i>Saponaria ocymoides</i> L., 1753	Saponaire faux-basilic	2020
	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnaveille annuelle	2020
	<i>Spergula segetalis</i> (L.) Vill., 1789	Spergulaire des moissons	2020
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	2020
Cistaceae	<i>Cistus monspeliensis</i> L., 1753	Ciste de Montpellier	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Crassulaceae	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	Orpin réfléchi	2020
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	Genévrier oxycèdre	2020
Cyperaceae	<i>Carex caryophylla</i> Latourr., 1785	Laïche printanière	2020
	<i>Carex oedipostyla</i> Duval-Jouve, 1870	Laïche à style bulbiforme	2020
	<i>Cyperus badius</i> Desf., 1798	Souchet bai	2020
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux	2020
Cytinaceae	<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L., 1767	Cytinet	2020
	<i>Cytinus ruber</i> Fritsch, 1922	Cytinet de L'écluse	2020
Emydidae	<i>Emys orbicularis</i> (Linnaeus, 1758)	Cistude d'Europe	2020
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	Arbousier commun	2020
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	Euphorbe des vallons	2020
Fabaceae	<i>Biserrula pelecinus</i> L., 1753	Biserrule en forme de hache	2020
	<i>Ervum gracile</i> (Loisel.) DC., 1813	Vesce à fleurs lâches	2020
	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	2020
	<i>Lathyrus annuus</i> L., 1753	Gesse annuelle	2020
	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse aphyllé	2020
	<i>Lathyrus clymenum</i> subsp. <i>articulatus</i> (L.) Ball, 1878	Gesse articulée	2020
	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds	2020
	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé	2020
	<i>Lupinus angustifolius</i> subsp. <i>angustifolius</i> L., 1753	Lupin bleu	2020
	<i>Ononis mitissima</i> L., 1753	Bugrane sans épines	2020
	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i> L., 1753	-	2020
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	2020
	<i>Trifolium repens</i> var. <i>biasoletii</i> (Steud. & Hochst.) Asch. & Graebn., 1907	Trèfle prostré	2020
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée	2020
	<i>Vicia narbonensis</i> L., 1753	Vesce de Narbonne	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	2019
	<i>Vicia serratifolia</i> Jacq., 1778	Vesce à feuilles dentées en scie	2020
Fumariaceae	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale solide	2020
Gentianaceae	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	Petite centaurée délicate	2020
Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluet	2020
Iridaceae	<i>Gladiolus italicus</i> Mill., 1768	Glaïeul des moissons	2020
Isoetaceae	<i>Isoetes velata</i> A.Braun, 1850	Isoète voilé	2020
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	2020
	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	Luzule de Forster	2020
Lamiaceae	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Calament glanduleux	2020
	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804	Galéopsis à feuilles étroites	2020
	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre	2020
	<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> L., 1753	-	2020
	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	2020
	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot	2020
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	2020
	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois	2020
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	Lis martagon	2019
	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp., 1914	Tulipe des Alpes	2020
Linaceae	<i>Linum strictum</i> L., 1753	Lin raide	2020
	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	Lin de France	2020
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	Lin bisannuel	2020
	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux-lin	2019
Lythraceae	<i>Lythrum junceum</i> Banks & Sol., 1794	Salicaire-jonc	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i> var. <i>thomasi</i> (Duby) Boiss., 1884	Piptathère de Thomas	2020
	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss., 1855	Venténate douteuse	2020
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome	2020
	<i>Rumex bucephalophorus</i> L., 1753	Oseille tête-de-boeuf	2020
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	Oseille ronde	2020
Polypodiaceae	<i>Polypodium cambricum</i> L., 1753	Polypode austral	2020
Pteridaceae	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link, 1841	Anogramme à feuilles minces	2020
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	2020
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Nerprun Alaternes	2020
Rosaceae	<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908	Alchémille oubliée	2020
	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage	2020
	<i>Potentilla hirta</i> L., 1753	Potentille velue	2020
	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	Merisier vrai	2020
	<i>Rosa gallica</i> L., 1753	Rose de France	2020
	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763	-	2020
	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs	2020
	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	Alisier des bois	2020
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse	2020
Rutaceae	<i>Ruta chalepensis</i> L., 1767	Rue de Chalep	2019
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	2020
	<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier commun noir	2020
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia peregrina</i> L., 1753	Scrophulaire voyageuse	2020
Simaroubaceae	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Faux vernis du Japon	2020
Solanaceae	<i>Solanum tuberosum</i> L., 1753	Pomme de terre	2020



Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Date de la dernière observation
Malvaceae	<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel., 1837	Mauve en arbre	2020
	<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Mauve hérissée	2020
	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	2020
Myrtaceae	<i>Myrtus communis</i> L., 1753	Myrte commun	2020
Onagraceae	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Epilobe des montagnes	2020
Orchidaceae	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806	Orchis de Provence	2019
	<i>Orobanch</i> L., 1753	-	2020
	<i>Phelipanche lavandulacea</i> (F.W.Schultz) Pomel, 1874	Orobanch couleur de Lavande	2020
	<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel, 1874	Orobanch rameuse	2020
Papaveraceae	<i>Fumaria bastardii</i> Boreau, 1847	Fumeterre de Bastard	2020
	<i>Fumaria flabellata</i> Gasp., 1842	Fumeterre en éventail	2020
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune	2020
	<i>Globularia alypum</i> L., 1753	Turbith	2020
	<i>Globularia vulgaris</i> L., 1753	Globulaire commune	2020
	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	2020
Poaceae	<i>Aira provincialis</i> Jord., 1852	Canche de Provence	2020
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	2020
	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Brachypode penné	2020
	<i>Brachypodium retusum</i> (Pers.) P.Beauv., 1812	Brachypode rameux	2020
	<i>Briza minor</i> L., 1753	Petite amourette	2020
	<i>Corynephorus articulatus</i> (Desf.) P.Beauv., 1812	Corynéphore articulé	2020
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie	2020
	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle	2020
	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	lvraie vivace	2020
	<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée	2020
	<i>Phalaris minor</i> Retz., 1783	Alpiste mineur	2020

Remerciements



Le Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur remercie tout particulièrement Nelly Laprée pour son investissement, durant deux années à nos côtés, pour l'élaboration de l'Atlas de la biodiversité communale de Collobrières. Il salue également l'aide et l'implication précieuses de Magalie Aferiat, animatrice Natura 2000, dans ce projet et son développement. Le CEN PACA remercie également chaleureusement Mme Christine AMRANE pour avoir permis au Conservatoire de participer à ce beau travail d'amélioration des connaissances naturalistes et d'implication citoyenne sur le territoire de sa commune de Collobrières. Enfin, le CEN PACA adresse ses remerciements à l'équipe de l'Office du tourisme Cuers - Collobrières - Pierrefeu pour son accompagnement dans la diffusion des informations et la mobilisation des citoyens dans le projet, et Joris Leprêtre-Milla, stagiaire dans le cadre de cet ABC, pour sa participation et sa motivation dans les actions menées.



**Pour participer à
la protection de la
nature près de chez
vous**

**Rejoignez le Conservatoire
d'espaces naturels de
Provence-Alpes-Côte d'Azur**

www.cen-paca.org



Siège social - CEN PACA
Immeuble Atrium Bât. B
4, avenue Marcel Pagnol
13100 Aix-en-Provence
Tél : 04 42 20 03 83

CEN PACA - Pôle Var
L'Astragale
888 chemin des Costettes
83340 Le Cannet-des-Maures
Tél : 04 94 50 38 39

